


# MATEMATIIKAN PERUSTEET TIEOTEKNIIKASSA 2

## SISÄLTÖ

- DERIVOINTI = KASVUNOPEUS
- INTEGROINTI = PINTA-ALAN KERTYMI
- NÄIDEN SOVELLUKSET

ALOITETAAN  
NOIN KLO 19,05



ESIMERKKI. SUORA PISTEIDEN


$$p = \overset{x}{\underset{y}{(1, 2)}} \\ q = \overset{x}{\underset{y}{(7, 3)}}$$

KAUTTA.

- PIIRRÄ OK
- LASKE KULMAKERROIN OK
- SIVITTÄÄ SUORAN YHTÄLÖ

$$\boxed{k = 1}$$

- LASKE KULMAKERROIN OK
- SELVITTÄÄ SUORAN YHTÄLÖ



$$\text{KULMAKERROIN} = k = \frac{y:n \text{ MUUTOS}}{x:n \text{ MUUTOS}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$p = (1, 2)$$

$$= \frac{3 - 2}{7 - 1} = \frac{1}{6}$$

SUORAN YHTÄLÖ

$$y - y_1 = k(x - x_1)$$

$$y - 2 = \frac{1}{6}(x - 1)$$

$$y - 2 = \frac{1}{6}x - \frac{1}{6} \quad || + 2 = \frac{12}{6}$$

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{11}{6}$$

$$y = kx + b$$

FROM THE MAKERS OF WOLFRAM LANGUAGE AND MATHEMATICA

**WolframAlpha**

derivative of  $x^2$  at  $x=1$

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

Input interpretation

$$\frac{\partial x^2}{\partial x} \text{ where } x = 1$$


Result

2

TARKISTUS  
WOLFRAM ALPHALLA

ESIM. YLLÄOLEVAA

TARVITAAN JATKOSSA.



$y - y_1 = k(x - x_1)$   
 $y - 1 = 2(x - 1)$   
 $y - 1 = 2x - 2 \parallel +1$   
 $y = 2x - 1$

$= f'(2)$  ← ENSI KIIKKOLA  
 VOIDAAN KÄYTTÄÄ FUNKTION ARVIOINTIIN  
 $x^2 \approx 2x - 1, \text{ KUN } x \approx 1$   
 $\Rightarrow (1.01)^2 \approx 2 \cdot 1.01 - 1 = 2.02 - 1 = \underline{\underline{1.02}}$

DERIVAATTA SOVELTUU SIIS HYVIN FUNKTIOIDEN ARVIOINTIIN

ESIM. TILILLÄ ON 1000 €,  
 KORKO ON 2%.  
 MONEKKO VUODEN PÄÄSTI  
 TILILLÄ ON 2000 €?

RATKAISU.  $1000 \cdot 1.02^n = 2000 \parallel : 1000$   
 $1.02^n = 2 \parallel \ln()$

TUNTE MATON  
 POTENSSISSA  
 $\Rightarrow$  LOGARITMI!

$\ln(1.02^n) = \ln(2)$

$n \ln(1.02) = \ln(2) \parallel : \ln(1.02)$

$n = \frac{\ln(2)}{\ln(1.02)} \approx \frac{0.7}{\frac{2}{100}} = \frac{70}{2} = 35$   
 $\ln(1 + \frac{2}{100})$

$\ln(1+x) \approx x, \text{ KUN } x \approx 0$

ESIM. KAKSINKERTASTUMINEN

$VUOSIA = n = \frac{70}{p}$  (kun p on pieni)  
 KORKOPROSENTTI

ESIM. KORKO 1%, 1000€  $\xrightarrow{n}$  2000€

RATKAISU.  $n = \frac{70}{1} = \underline{\underline{70}}$

MOODLE → PDF → 5 PALAUTETTAVAA  
SUORISTA


## INTEGRAALI (= PINTA-ALAN KERTYMI)

integral from  $x=0$  to  $x=\pi$   $\sin(x)$  dx

Definite integral

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx = 2 = \text{ALA}$$

Visual representation of the integral



$$a=0 \quad b=\pi=3.14$$

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx = ?$$


KAKSI VAIHETTA

- ① ETSITÄÄN INTEGRAALIFUNKTIO
  - ② SIIJOITETAAN
- VOI OLLA VAIKEAA, OPETELAA VÄHITELLEN
- MEKANISMI, YLÄ - ALA

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx = \int_0^{\pi} -\cos(x) dx = -\cos(\pi) - (-\cos(0))$$


$$= 1 - (-1) = 2$$

HARJOITELLAAN TÄLLÄ VIIKOLLA



$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

SIIJOITTAMINEN



ESIM.

$$\int_1^5 e^x dx = e^5 - e^1 \approx 141$$

MUISTA SULUT



$$2^5 - 3^5 = 2^{\textcircled{5}} - 3^{\textcircled{5}} - (2^{\textcircled{2}} - 3^{\textcircled{2}})$$

MUISTA SULUT

LASKIN  $e^5 = \exp(5)$




$$[e] \& [x^y] \& [5] \& [=] \rightarrow e^5$$

$$[2.718] \& [x^y] \& [5] \& [=] \rightarrow e^5$$

$$e^5 - e^2 = 148 - 7.4 \approx 141 \neq e^3 \approx 20$$

↑  
LASKIN

7. Laske alla olevien kuvien varjostetut pinta-alat. Riittää laskea sijoitukset.



KUVAN PERUSTEELLA

SUORAKULMIKO

$$= \text{ALA} = \text{KANTA} \cdot \text{KORKEUS}$$

$$= 2 \cdot 2 = 4$$

SAMA

$$\int_1^3 2dx = \left[ 2x \right]_1^3 = 2 \cdot 3 - 2 \cdot 1 = 6 - 2 = 4$$

Tehtäviä. Voit myös piirtää tehtävissä kuvat, jos haluat.

1. Tarkastellaan pisteiden  $p = (1, 3)$  ja  $q = (4, 2)$  kautta kulkevaa suoraa. Määritä suoran kulmakerroin ja suoran yhtälö normaalimuodossa. **Solution**  $k = -1/3$ ,  $y = -\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$
2. Tarkastellaan pisteiden  $p = (1, 2)$  ja  $q = (4, 2)$  kautta kulkevaa suoraa. Määritä suoran kulmakerroin ja suoran yhtälö normaalimuodossa. **Solution**  $k = 0$ ,  $y = 2$
3. Tarkastellaan pisteiden  $p = (1, 2)$  ja  $q = (1.01, 4)$  kautta kulkevaa suoraa. Määritä suoran kulmakerroin ja suoran yhtälö normaalimuodossa. **Solution**  $k = 200$ ,  $y = 200x - 198$
4. Tarkastellaan suoraa  $3y = 2x + 1$ . Kirjoita yhtälö muodossa  $y = kx + b$ . Mikä on suoran kulmakerroin  $k$ ? Etsi kaksi suoran pistettä. Piirrä suoran kuvaaja. **Solution**  $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$ , esim.  $p = (1, 1)$  ja  $q = (4, 3)$

4. RATKAISU

$$3y = 2x + 1$$

$$y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$$


$= k$

| x | 2 <sup>x</sup> |
|---|----------------|
| 0 | 1              |
| 1 | 2              |
| 2 | 4              |




| x | $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$                                    | (x, y)              |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0 | $\frac{1}{3}$                                                       |                     |
| 1 | $\frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} = \frac{2+1}{3} = 1$             | $(1, 1)$            |
| 5 | $\frac{2}{3} \cdot 5 + \frac{1}{3} = \frac{10+1}{3} = \frac{11}{3}$ | $(5, \frac{11}{3})$ |


$\approx 3.66$



5. Määritä alla olevassa kuvassa pisteet  $p$  ja  $q$ . Määritä suoran kulmakerroin ja suoran yhtälö normaalimuodossa. **Solution**  $y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$




5. Määritä alla olevassa kuvassa pisteet  $p$  ja  $q$ . Määritä suoran kulmakerroin ja suoran yhtälö normaalimuodossa. [Solution](#)  
 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$




6. Laske sijoitukset.

- (a)  $\int_3^4 x^2$  [Solution](#) 7  
 (b)  $\int_3^4 \frac{1}{x}$  [Solution](#)  $-\frac{1}{12}$   
 (c)  $\int_2^3 2x^2 - x$  [Solution](#) 9  
 (d)  $\int_2^6 \ln(x)$  [Solution](#)  $\ln(3)$   
 (e)  $\int_0^\pi \cos(x)$  [Solution](#) -2



$$\int_1^3 0.5x dx = \int_1^3 0.25x^2 =$$



$$\int_1^3 2 + 0.5x dx = \int_1^3 2x + 0.25x^2 =$$

19.00 - 20.00

- LASKE TAAAN
- VOIDAAN KATSOA JOKU ESI-MERKKI, JNS ON TÄRKEÄ.

• VOIDAAN KATSOA JOKU ESIMERKKI, JOS ON TARVETTA

6. Laske sijoitukset.

(a)  $\int_3^4 x^2$  Solution 7

(b)  $\int_3^4 \frac{1}{x}$  Solution  $-\frac{1}{12}$

(c)  $\int_2^3 2x^2 - x$  Solution 9

(d)  $\int_2^6 \ln(x)$  Solution  $\ln(3)$

(e)  $\int_0^\pi \cos(x)$  Solution -2

JOS KÄYTTÄÄN

→ ASTETTA


$\cos(45^\circ)$

PELKKIÄ LUKUJA

⇒ RADIOAANEJA

Sijoitus :


$\int_a^b F(x) = F(b) - F(a)$




$\cos(\alpha) = \frac{a}{c}$

(e)

$\int_0^\pi \cos(x) = \cos(\pi) - \cos(0)$   
 $= -1 - 1 = -2$



SAA LASKIMELLA TÄI



YKSIKKÖYMPYRÄ'S TÄI

JOS ON ASTETTA,

TULEE VÄÄRÄ ARVO

cos(pi degrees)

NATURAL LANGUAGE  $\int_0^\pi \cos(x)$

Input

cos( $\pi^\circ$ )

Exact result

cos( $\frac{\pi^2}{180}$ )

Decimal approximation


0.99849714986386383362

- KULMIA VOI ILMOITTAA ASTEINA JA RADIAANEINA
- OPE KÖETÄÄ OLLA SELKEÄ
- TÄLLÄ KURSSILLA ~~ER~~ RADIAANIT OVAT HYÖDYLLISIÄ, KOSKA SAADAN KAAVOJA, JOITKA TOIMIVAT VAIN NIILLÄ

RADIAANIN HYÖTY,  
HYVIÄ KAAVOJA

$$\sin(x) \approx x, \text{ kun } x \approx 0$$

$$\cos(x) \approx 1 - x^2, \text{ kun } x \approx 0$$




5. Määritä alla olevassa kuvassa pisteet  $p$  ja  $q$ . Määritä suoran kulmakerroin ja suoran yhtälö normaalimuodossa. [Solution](#)

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$$

$$p = (x, y) = (1, 3)$$

$$q = (3, 2)$$



KULMAKERROIN =  $k$

$$= \frac{y:n \text{ muutos}}{x:n \text{ muutos}} = \frac{-1}{2}$$

$$k = -\frac{1}{2}$$

TOINEN KULMIO

$$k = \frac{-3}{-1}$$

$x_1, y_1$

JOINED POINTS

$$k = \frac{-3}{+6} = -\frac{1}{2}$$

TAPA 2 (SÖKKÖNÄ ILMAN KUVAA)

$$p = (x_1, y_1) = (1, 3)$$
$$q = (x_2, y_2) = (3, 2)$$

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2 - 3}{3 - 1} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$$

SUORAN YHTÄLÖ

$$y - y_1 = k(x - x_1)$$

$$y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 1)$$

$$y - 3 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \quad || +3$$

$$y = -\frac{1}{2}x + \underbrace{3 + \frac{1}{2}}_{= \frac{6}{2} + \frac{1}{2}}$$

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$$

NORMAALI-MUOTO  
 $y = kx + b$

SUORIA ERI MUODOSSA

$$y = 2x + 3$$

$$y - 2x - 3 = 0$$

JOINED POINTS

# YLIMÄÄRÄINEN ESIMERKKI, EI TARVITSE OPETELLA

$$3y + 2x = 7$$

$$\frac{1}{(\frac{1}{a})} = 1 : \frac{1}{a} = 1 \cdot \frac{a}{1} = \underline{a}$$


$$3y + 2x = 7$$

$$\frac{y}{\frac{1}{3}} + \frac{x}{\frac{1}{2}} = 7 \quad || : 7$$


$$\frac{y}{\frac{7}{3}} + \frac{x}{\frac{7}{2}} = 1$$

2,33 =  $\frac{7}{3}$        $\frac{7}{2} = 3,5$

AKSELIN  
LEIKKAUS PISTEET





$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



ENSI VAIKOLLA

D  $\curvearrowright x^3 = 3x^2$

Q  $\int x^7 dx = \frac{x^8}{8}$





$$\text{PIN TA-ALA} = 2 \cdot 1 = \underline{\underline{2}}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\int_1^3 0.5x dx = \int_1^3 0.25x^2 =$$

$$\begin{aligned} \int_1^3 0.25x^2 &= 0.25 \cdot 3^2 - 0.25 \cdot 1^2 \\ &= 0.25(3^2 - 1^2) = 0.25(9 - 1) \\ &= 0.25 \cdot 8 = \underline{\underline{2}} \end{aligned}$$



$$\text{ALA} = \underline{\underline{6}}$$

$$\int_1^3 2 + 0.5x dx = \int_1^3 2x + 0.25x^2 =$$

$$\begin{aligned} \int_1^3 2x + 0.25x^2 &= 2 \cdot 3 + 0.25 \cdot 3^2 \\ &\quad - (2 \cdot 1 + 0.25 \cdot 1^2) \\ &= 6 - 2 + 0.25(3^2 - 1^2) \\ &= 4 + 2 = \underline{\underline{6}} \end{aligned}$$







ESIM. FUNKTIO  $f(x) = x^2$ .

KASVUNOPEUS = DERIVAATTA,

KUN  $x=1$ .

| $x$ | $y = x^2$ |
|-----|-----------|
| 0   | $0^2 = 0$ |
| 1   | $1^2 = 1$ |
| 2   | $2^2 = 4$ |





RAJA-ARVO  
 = LIMIT  
 = LIMES



KASVUNOPUS  
 $k = 2$   
 $y = 2x - 1$   
 $k = 2$

LASKEMALLA

$$k = f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\frac{f(1+h) - f(1)}{(1+h) - 1}$$

$$(f(x) = x^2)$$

SEKANTIN  
 KUUNAKEROIN

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - (1^2)}{h}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1^2 + 2 \cdot 1 \cdot h + h^2 - 1^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2+h = 2+0 = 2$$

# DERIVAATAN MATEMAATTINEN MÄÄRITELMÄ

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

EI KÄYTETÄ PALJON KURSSILLA,  
DERIVOINTIKAAVAT JOHDetaan TÄMÄN AVULLA,

VIKKON  
DERIVOINTIKAAVA:

$$f', \dot{f}, \frac{df}{dx}, \boxed{Df}$$

$$D x^n = n x^{n-1}$$

DERIVAATAN  
MERKKIVÖLJÄ

ESIM.  $D x^7 = 7 x^6$

$$D x^{120} = 120 x^{119}$$

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{x^5} = x^{-5}$$

VAKIO  
SÄILYY

$$D 5x^3 = 5 \cdot 3x^2 = 15x^2$$

DERIVOINNIN  
SUMMASSA  
ERIKSEEN

$$D 3x^4 + 4x^7 = 12x^3 + 28x^6$$

$$D \sqrt{x} = D x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$$


$$D \frac{1}{x^3} = D x^{-3} = \underline{\underline{-3x^{-4}}} = \underline{\underline{-\frac{3}{x^4}}}$$

$$= \underline{\underline{\frac{1}{2\sqrt{x}}}}$$

$$D x^{2.1} = 2.1 x^{1.1}$$

$$D x^{2.1} = \underline{\underline{2.1 x^{1.1}}}$$

### 2.3 Polynomien derivointi ja kuvaaja




4. Olkoon  $f(x) = x^2 - 1$ . Laske
- (a)  $f'(x)$  Solution  $2x$
  - (b)  $f'(-2)$  Solution  $-4$
  - (c)  $f'(-1)$  Solution  $-2$
  - (d)  $f'(0)$  Solution  $0$
  - (e)  $f'(1)$  Solution  $2$
  - (f)  $f'(2)$  Solution  $4$
5. Selvitä funktion  $f(x) = x^2 - 1$  kuvaajalle pisteeseen  $(1, 0)$  piirretyn tangenttisuoran yhtälö.  
Solution  $y - 0 = 2(x - 1)$
6. Selvitä funktion  $f(x) = x^2 - 1$  kuvaajalle pisteeseen  $(0, -1)$  piirretyn tangenttisuoran yhtälö.  
Solution  $y = -1$
7. Selvitä funktion  $f(x) = x^2 - 1$  kuvaajalle pisteeseen  $(-2, 3)$  piirretyn tangenttisuoran yhtälö.  
Solution  $y - 3 = -4(x - (-1))$

MELKO PALJON  
TEKEMISTÄ,  
EI PAKKO  
LASKEA  
KAIKKEA

ESIM.  $f(x) = x^{2.1}, x \geq 0$

$f'(x) = ?$

$f'(3) = ?$



RAITKAISU.  $f(x) = x^{2.1}$


Sijoitetaan  $x = 3$

$f'(x) = D x^{2.1} = 2.1 x^{1.1}$

$f'(3) = 2.1 \cdot 3^{1.1} = 7.03158 \approx \boxed{7.03}$


SOVELLUS. MIN/MAX

$f'(x_0) = k = 0$



min/max PAIKAT LÖYTÄÄ EHDOST  $f'(x)=0$

ESIM.  $f(x) = x^2(1-x) \Rightarrow f(1) = 1 \cdot 0 = 0$



RATKAISU. AUKAISTAAN SULUT  $f(x) = x^2 - x^3$

DERIVOIDAAN  $f'(x) = 2x - 3x^2 = 0$

$$2x - 3x^2 = 0 \quad (1) \text{ RATKAISUKAAVA}$$

$$(2) \quad x(2 - 3x) = 0$$

$$\begin{aligned} x &= 0 & \text{tai} & \quad 2 - 3x = 0 \\ & & \Rightarrow & \quad 2 = 3x \quad || :3 \\ & & \Rightarrow & \quad \frac{2}{3} = x \\ & \Rightarrow & & \quad x = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

DERIVOINTI

$$D \ x^{(n)} = n x^{n-1}$$

n      n+1


INTEGRATION

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

INTEGRAL -  
MÄRKKI

ESIM.

$$\int_0^2 x^2 dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3}$$



$$ALA = \frac{8}{3}$$

FROM THE MAKERS OF W



derivative at x=2 of f(x)=x^2-1

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

Input interpretation

$$\frac{\partial (f(x) = x^2 - 1)}{\partial x} \text{ where } x = 2$$

Result

$$f'(2) = 4$$

Alternate form

$$f'(2) - 4 = 0$$

Plot



FROM THE MAKERS



integral x=0 to x=2 x^2


NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

Definite integral

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3} \approx 2.6667$$

Visual representation of the integral



1. Derivoi monomit.

(a)  $3x^5$

(b)  $-3x^{11}$

(c)  $4x^1$

(d) 2 eli  $2x^0$

Solution  $15x^4$

Solution  $-33x^{10}$

Solution 4

Solution 0

a)  $D 3x^5 = 15x^4$

b)  $\frac{d}{dx} -3x^{11} = -33x^{10}$

$D 4x = \underline{4}$

c)  $(4x^1)' = 4 \cdot \underbrace{1}_{=1} \cdot \underbrace{x^0}_{=1} = \underline{4}$

$(\sin(x))' = \cos(x)$

$(fg)' = f'g + fg' \leftarrow$  HELEPOU KIRJOITTA

$D(fg) = g Df + f Dg$

d)  $D 2 = D 2 \underbrace{x^0}_{=1} = 2 \cdot 0 \cdot x^{-1} = 0$

$D 2 = 0$

↑  
VAKIO,

VAKIOFUNKTIO  $\Leftrightarrow$  kasvua  $\Rightarrow$  kasvunopeus  $= 0$

2. Derivoi muuttujan  $x$  potenssit

(a)  $\frac{3}{x^2} = 3x^{-2}$

(b)  $\sqrt{x}$

(c)  $x\sqrt{x}$

(d)  $2x^{-2.3}$


$x^{\frac{1}{2}}$

$a^b a^c = a^{b+c}$

①  $x\sqrt{x} = x^1 x^{\frac{1}{2}} = x^{1+\frac{1}{2}} = x^{\frac{3}{2}}$

$D x\sqrt{x} = D x^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} x^{\frac{3}{2}-1} = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2} \sqrt{x}$

### 2.3 Polynomin derivointi ja kuvaaja



$D x^2 - 1 = 2x + 0 = 2x$

4. Olkoon  $f(x) = x^2 - 1$ . Laske

(a)  $f'(x) = 2x$  Solution  $2x$

(b)  $f'(-2) = 2(-2) = -4$  Solution  $-4$

(c)  $f'(-1) = 2(-1) = -2$  Solution  $-2$

(d)  $f'(0) = 2 \cdot 0 = 0$  Solution  $0$

(e)  $f'(1) = 2 \cdot 1 = 2$  Solution  $2$

(f)  $f'(2) = 2 \cdot 2 = 4$  Solution  $4$

5. Selvitä funktion  $f(x) = x^2 - 1$  kuvaajalle pisteeseen  $(1, 0)$  piirretyn tangenttisuoran yhtälö.

Solution  $y - 0 = 2(x - 1)$

6. Selvitä funktion  $f(x) = x^2 - 1$  kuvaajalle pisteeseen  $(0, -1)$  piirretyn tangenttisuoran yhtälö.

Solution  $y = -1$

7. Selvitä funktion  $f(x) = x^2 - 1$  kuvaajalle pisteeseen  $(-2, 3)$  piirretyn tangenttisuoran yhtälö.

Solution  $y - 3 = -4(x - (-1))$

$y - y_1 = k(x - x_1)$

SUORA

- Kulmakertoimen  $k$
- Pisteiden  $(x_1, y_1)$  kautta

5. NYT  $k=2$


JOKA PISTE ESIM.  $(x, y) = (1, 0)$



Now find eqn,  $(x, y) = (1, 0)$

$$y - 0 = 2(x - 1)$$

$$\underline{\underline{y = 2x - 2}}$$



$$y - y_1 = k(x - x_1)$$

$$y - (-1) = 0(x - 0) = 0$$

$$y - (-1) = 0$$

$$y + 1 = 0 \quad || -1$$

$$y = -1$$

$$+ 3x^2$$



$$+ 3x^2$$



8

8. Olkoon  $f(x) = 3x^2 + 5x + 13$ . Etsi ääriarvokohtat.

(a) Laske  $f'(x)$ .

Solution  $f'(x) = 6x + 5$

(b) Kirjoita  $f'(x) = 0$ .

Solution  $6x + 5 = 0$


(c) Ratkaise saadusta yhtälöstä  $x$ .

Solution  $x = -\frac{5}{6}$


(d) Voitko päätellä, onko kyseessä minimi vai maksimi?

Solution Minimi kohdassa  $x = -\frac{5}{6}$


ESIM.  $f(x) = -3x^2 + 7$



ESIM.  $f(x) = +3x^4$



ESIM. (JATKO)  $f(x) = x^2(1-x)$   
 $= x^2 - x^3$



$$f'(x) = 2x - 3x^2$$

$$\frac{2}{3} = 0.666$$

$$f'\left(\frac{2}{3}\right) = 0$$

$$f'(0.7) = -0.07$$

$$f''(0.6) = +0.12$$

KULKUKAAVIO

|         |               |   |   |
|---------|---------------|---|---|
|         | $\frac{2}{3}$ |   |   |
|         |               |   |   |
| $f'(x)$ | +             | 0 | - |
| $f(x)$  | ↗             | → | ↘ |

MAKSIMI PISTEISSÄ  $x = \frac{2}{3}$

# KIRJOITUSVIRHEITÄ

1. Derivoi monomit.

- (a)  $3x^5$   
(b)  $-3x^{11}$   
(c)  $4x^1$   
(d) 2 eli  $2x^0$

$-3x^{11}$  sk

7. Selvitä funktion  $f(x) = x^2 - 1$  kuvaajalle pisteeseen  $(-2, 3)$  piirretyt tangenttisuoran yhtälö.

Solution  $y - 3 = -4(x - (-2))$

$x_1 = -2$   $(-2)$

sk

## KÄYDÄÄN LÄPI AINAKIN

2. Derivoi muuttujan  $x$  potenssit

- (a)  $\frac{3}{x^2}$   
→ (b)  $\sqrt{x}$   
(c)  $x\sqrt{x}$   
(d)  $2x^{-2.3}$

Solution  $-6x^{-3}$

Solution  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

Solution  $\frac{3}{2}\sqrt{x}$

Solution  $-4.6x^{-3.3}$

(a)  $D \frac{3}{x^2} = D 3x^{-2} = 3 \cdot (-2)x^{-2-1} = -6x^{-3} = \frac{-6}{x^3}$

(b)  $D \sqrt{x} = D x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

(c)  $D x\sqrt{x} = D x^1 x^{\frac{1}{2}} = D x^{1+\frac{1}{2}} = \frac{3}{2} x^{1+\frac{1}{2}-1} = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$

$\begin{matrix} b & c \\ a & a \end{matrix} = a^{b+c}$

$3+5.7-1=37$

ESIM.

$D \frac{x^3 (x^5)^7}{x^1} = D x^3 \cdot x^{5 \cdot 7} \cdot x^{-1} = D x^{3+35-1} = D x^{37} = 37x^{36}$

ENS  
VIKKOLLA

$D (x^5)^7 = D x^{35} = 35x^{34}$  SAMAN

2 TAPAA

$D (x^5)^7 = 7(x^5)^6 \cdot \frac{D x^5}{5x^4} = 35x^{30+4}$

YHDISTETTÄ

# FUNKTIO

3  
5

→ 11. Olkoon  $f(x) = x^3(1-x)^2$ . Etsi ääriarvokohdat.

Solution Paikallinen maksimi kohdassa  $x = \frac{3}{5}$ .

WR

RATKAISU.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3(1-x)^2 \\ &= x^3(1^2 - 2 \cdot 1 \cdot x + x^2) \\ &= x^3(1 - 2x + x^2) \\ &= x^3 - 2x^4 + x^5 \end{aligned}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 8x^3 + 5x^4 = 0$$

$$x^2(3 - 8x + 5x^2) = 0$$

$$x^2 = 0 \quad \text{tai} \quad 5x^2 - 8x + 3 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\begin{cases} a = 5 \\ b = -8 \\ c = 3 \end{cases}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\begin{aligned} &4 - 5 \cdot 3 \\ &= 20 \cdot 3 = 60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 5 \cdot 3}}{2 \cdot 5} \\ &= \frac{8 \pm \sqrt{64 - 60}}{10} = \frac{8 \pm \sqrt{4}}{10} \end{aligned}$$


$$= \frac{8 \pm 2}{10}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{8+2}{10} = 1 \\ x_2 = \frac{8-2}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \end{cases}$$

$$f(x) = x^3(1-x)^2$$

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 0$$



← AINOA  
MAHDOLLINEN  
HUIPUN  
PAIKKA

VASTAUS: MAKSIMI  
KOHODASSA  $x = \frac{3}{5}$


$$f(x) = x^3(1-x)^2$$

$$= x^3(1^2 - 2 \cdot 1 \cdot x + x^2)$$

$$= x^3(1 - 2x + x^2)$$

$$= x^3 - 2x^4 + x^5$$

$$f\left(\frac{3}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right)^3 \left(1 - \frac{3}{5}\right)^2 \approx 0,03$$



$(\frac{3}{5})^3 \cdot (1 - \frac{3}{5})^2$

NATURAL LANGUAGE

Input

$(\frac{3}{5})^3 (1 - \frac{3}{5})^2$

Exact result










$\frac{108}{3125}$


Decimal form

0.03456

$x^n$  ERI  
n ARVOILLA

$y = x^0 = 1$






(d)  $\int_0^3 \sqrt{x} dx$

Solution  $2\sqrt{3} \approx 3.464$ .

RATKAISU.

$$\int_a^b x^n dx = \left[ \frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_a^b$$



$$\int_0^3 \sqrt{x} dx$$

$$= \int_0^3 x^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= \left[ \frac{x^{\frac{1}{2} + 1}}{\frac{1}{2} + 1} \right]_0^3 = \left[ \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^3$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

$$= \left[ \frac{x \sqrt{x}}{\frac{3}{2}} \right]_0^3 = \left[ \frac{2}{3} x \sqrt{x} \right]_0^3$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{3} - \frac{2}{3} \cdot 0 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$= 2\sqrt{3} \approx 3.464$$

4. Olkoon  $k(x) = 0.5^x$ .

(a) Laske  $k'(x)$ .

(b) Laske  $k'(0)$ .

Solution  $0.5^x \ln(0.5)$

Solution  $-0.69$

RATKAISU.

$$b(x) = 0.5^x$$

$$a^x, a > 0$$

$$D \frac{d}{dx} ( )'$$

$$k(x) = 0.5^x$$

du

(a)  $k'(x) = 0.5^x \ln(0.5)$

LASKIN

$\ln(0.5) \approx -0.69$

$\ln(0.5) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(2^{-1}) = -\ln(2) \approx -0.69$

$D a^x = a^x \ln(a)$


(b)  $k'(0) = 0.5^0 \ln(0.5) = 1 \cdot \ln(0.5) = \ln(0.5) = -0.69$

1.  $f(x) = 2^x$


VÄÄTÄN VÄÄTÄN  
kun  $x=0$

(a)  $f'(x) = 2^x \ln(2) \approx 0.69 \cdot (2^x)$

(b)  $f'(0) = 2^0 \ln(2) = 1 \cdot \ln(2) = 0.69$



PETÄKÄÄTÄ



$D a^x = a^x \ln(a)$


$D e^x = e^x \ln(e) = e^x$

2.7

$D e^x = e^x$

MIKÄ LUKU ON  
 $e = 2.7$  ?

①  
②




$e = 2.7$  ?




kulmakertoimen 1

3



### 3.2 Logaritmifunktion derivointi ja kuvaaja



3. Olkoon  $f(x) = \ln(x)$ . Laske

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| (a) $f'(x)$ | Solution $\frac{1}{x}$ |
| (b) $f'(1)$ | Solution 1             |
| (c) $f'(2)$ | Solution 0.5           |
| (d) $f'(3)$ | Solution 0.33          |
| (e) $f'(4)$ | Solution 0.25          |
| (f) $f'(5)$ | Solution 0.2           |

4. Selvitä funktion  $f(x) = \ln(x)$  kuvaajalle pisteeseen  $(1, 0)$  piirretyn tangenttisuoran

- |                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| (a) kulmakertoimen | Solution 1                                 |
| (b) yhtälö.        | <del>Solution <math>y = x - 1</math></del> |

$y = x - 1$  — ok

4. Laske integraalit.

$3^x$

- $\int_0^2 2^x dx$
- $\int_0^2 3^x dx$
- $\int_0^2 0.5^x dx$

Talking

Solution 4.3281

Solution 7.2819

Solution 1.082



## KURSSIN SISÄLLÖN JÄRJESTÄMINEN

ALKEIS FUNKTIO


YLEISIÄ

DERIVOINTIA

DERIVOINTI, KAULUJA

SOVELLUS

INTEGROINTIA



$$y = kx + b$$

$$D x^7 = 7x^6$$

POLYNOMI

$$D 7^x = 7^x \ln(7)$$

EKSONENTTI, F.

$$D 7^{x^3} = 7^{x^3} \ln(7) \cdot D x^3 = 7^{x^3} \ln(7) \cdot 3x^2$$

$$D f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x)$$

$$D \sin(x)$$

$$D \cos(x)$$

?

SISÄFUNKTION  
DERIVAATTA

?

?


ESIM.



$$y = 2^x$$

3

3




$$A = \int_1^3 2^x dx = \left[ \frac{2^x}{\ln(2)} \right]_1^3$$

$$= \frac{2^3 - 2^1}{\ln(2)}$$

$$= \frac{7}{\ln(2)} \approx \frac{7}{0.7} \approx 10$$

$\ln(2) \approx 0.69 \approx 0.7$

KÄÄNNEPISTE



ESIM.  $f(x) = x^{10} + x^9$

ETSI KÄÄNNEPISTEET.

RATKAISU.

(a)  $f(x) = x^{10} + x^9$

$$f'(x) = 10x^9 + 9x^8$$

$$f''(x) = 90x^8 + 72x^7$$

$$= 9x^7(10x + 8) = 0$$

Joko  $x^7 = 0$  Tai  $10x + 8 = 0$

$$x = 0$$

$$10x = -8$$

VASTAUS

$$x = -0.8$$

VASTAUS

$$x = -0.8$$

YHDISTETYN FUNKTION DERIVANTTI

"Doo"  
[D - Wikipedia](#)  
Merkinnän keksi ranskalainen  
Vuonna 1770

$$D f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x)$$

$$\underbrace{D}_{\frac{d}{dx}} \underbrace{f}_{( )'} \underbrace{g(x)}_{\frac{\partial}{\partial x}}$$

$$\frac{d}{dx} f = \frac{d f}{d t} \frac{d t}{d x}$$

ESIM.

$$\frac{d}{dx} e^{x^3} = \frac{d}{dx} e^t = \underbrace{\frac{d e^t}{d t}}_{e^t = e^{x^3}} \cdot \underbrace{\frac{d t}{d x}}_{\frac{d x^3}{d x} = 3x^2} = e^{x^3} \cdot 3x^2$$

ESIM.  $D x^7 = 7x^6$

$$D (x^3 + 2x^5)^7 = 7 \underbrace{(x^3 + 2x^5)^6}_{\uparrow} \underbrace{D (x^3 + 2x^5)}_{\uparrow} = 7(x^3 + 2x^5)^6 \cdot (3x^2 + 10x^4)$$

ESIM.

$$D 2^{3^x} = D 2^{(3^x)} = 2^{3^x} \cdot \ln(2) \cdot \underbrace{D 3^x}_{3^x \ln(3)} = 2^{3^x} \cdot 3^x \cdot \ln(2) \ln(3)$$

$$= \underline{\underline{2^{3^x} \cdot 3^x \cdot \ln(2) \ln(3)}}$$

ESIM.  $D 2^{x^3} = 2^{x^3} \ln(2) \cdot \underbrace{D x^3}_{3x^2}$

ESIM.  $D (2^x)^7 = 7(2^x)^6 \cdot \underbrace{D 2^x}_{2^x \ln(2)}$

---

$$7. (e) D e^{5x+1} = e^{5x+1} D(5x+1)$$

$$(f) D 2^{3x} = e^{5x+1} (5+0)$$

$$= 5 e^{5x+1}$$

8. Laske

(a)  $D e^{\sqrt{x}}$

(b)  $D e^{(1/x^2)}$

(c)  $D 2^{(1/\sqrt{x})}$

$$D 2^{3x} = 2^{3x} \cdot \ln(2)$$

$$\cdot D 3x$$

$$= 2^{3x} \ln(2) \cdot 3$$

$$D e^x = e^x$$

$$D x^n = n x^{n-1}$$

$$D 5x^1 = 5 \cdot 1 \cdot x^{1-1} = 5$$

$$= x^0 = 1$$

$$\bullet D 5x = 5$$

$$\bullet D 1 = 0$$

vakio

Solution  $5e^{5x+1}$

Solution  $2^{3x} \cdot 3 \cdot \ln(2)$

Solution  $e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Solution  $e^{(1/x^2)} \cdot \frac{-2}{x^3}$

Solution  $2^{(1/\sqrt{x})} \cdot \frac{-1}{2x\sqrt{x}}$

8. Laske

(a)  $D e^{\sqrt{x}}$

(b)  $D e^{(1/x^2)}$

(c)  $D 2^{(1/\sqrt{x})}$

Solution  $e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Solution  $e^{(1/x^2)} \cdot \frac{-2}{x^3}$

Solution  $2^{(1/\sqrt{x})} \cdot \frac{-1}{2x\sqrt{x}} \cdot \ln(2)$

$$8.a) D e^{\sqrt{x}} = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$D e^x = e^x$$

$$D \sqrt{x} = D x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$b) D e^{\frac{1}{x^2}}$$

$$= e^{\frac{1}{x^2}} \cdot \frac{-2}{x^3}$$

$$D \frac{1}{x^2} = D x^{-2} = -2 x^{-3}$$

$$= \frac{-2}{x^3}$$

$$D 2^{\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

$$= 2^{\frac{1}{\sqrt{x}}} \ln(2) D \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$= 2^{\frac{1}{\sqrt{x}}} \ln(2) \frac{-1}{2\sqrt{x}}$$

$$= -2^{\frac{1}{\sqrt{x}}-1} \frac{\ln(2)}{x^{3/2}}$$

$$D \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$D \frac{1}{\sqrt{x}} = D x^{-\frac{1}{2}}$$

$$= -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{-1}{2 x^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1}{2x\sqrt{x}}$$

$$D 2^x = 2^x \ln(2)$$

$$= x \sqrt{x}$$

derivative of  $2^{1/\sqrt{x}}$

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

Derivative

$$\frac{d}{dx} \left( \sqrt{x} \sqrt{2} \right) = - \frac{2^{1/\sqrt{x}-1} \log(2)}{x^{3/2}}$$

9. Laske (Lähde: Kari Jyrkkä, 295s)

(a)  $D2x^3$

Solution  $6x^2$

(b)  $D(2x^3)^5$

Solution  $5 \cdot (2x^3)^4 \cdot 6x^2$

(c)  $\frac{\partial}{\partial k} (2x^3 + 2k^2)^5$

Solution  $5(2x^3 + 2k^2)^4 \cdot 4k^1$

↑ VAKIO MUUTTUJAN K SUHTEEN  
DERIVOIDAANKIN K:N SUHTEEN

10. Olkoon  $f(x) = 2^x$ . Laske

(a)  $f'(x)$

Solution  $2^x \ln(2)$

(b)  $f'(0)$

Solution  $\ln(2) \approx 0.7$

(c)  $f'(1)$

Solution 1.4

(d)  $f'(2)$

Solution 2.8

(e)  $f'(-1)$

Solution 0.35

(f)  $f'(-2)$

Solution 0.175

10. (a)  $f(x) = 2^x$

$f'(x) = D 2^x = \underline{\underline{2^x \ln(2)}}$

(e)  $f'(-1) = 2^{-1} \ln(2) = \underline{2^{-1} \ln(2)} = 0.3465$   
 $\approx 0.35$

$\frac{d}{dx} \uparrow$   
 $\underbrace{2^{-1} \ln(2)}_{\substack{\text{EI RIIPU} \\ x: \text{sta}, \\ \text{VAKIO}}} = 0$


$\boxed{\begin{array}{l} D 2^{-1} \ln(2) = -\frac{1}{2} \ln(2) \\ D \text{ VAKIO} = 0 \end{array}}$

DERI + SIJ. + DERI 0  
LASKIN DERI + DERI + SU. 1

10. (P)  $f(x) = 2^x$   
 $f'(x) = 2^x \ln(2)$   
 $f'(-2) = 2^{-2} \ln(2) \approx \frac{0.35}{2} = 0.175$   
 ARVO KÄSIN  $\frac{\ln(2)}{2^2} = \frac{\ln(2)}{4} \approx \frac{0.7}{4} = 0.175$

EI TARVITSE LASKEA KÄSIN, MUTTA

OPETTE:  $2^{-2} = \frac{1}{2^2}$  POT. LASKU-SÄÄNNÖT



- $\ln(2^3) = 3 \ln(2)$
- $\ln(e) = 1$
- $\sin(0) = 0$

KOE ① SATUNNAISLUKUISIA

D  $2^x$

D  $3^x$


D  $7^x$

② TOIVOTTAVASTI  
EI VÄLIVAIHEITA  
KUNTA TARVITSE  
PALAUTTAA

PALAUTETAAN  
VÄLIVAIHEET


→ JOS SATUI LASKUVIRHE,  
KERRO OPETTAJALLE

$(x_1, y_1) = (0, 1)$



11. (a)  $k = ?$

(b)



⑥  
 $y = kx + b$  ?

RATKAISU. (a)  $k = f'(0) = \text{kasvunopeus}$   
 $f(x) = 2^x$   
 $f'(x) = 2^x \ln(2)$   
 $= 2^0 \ln(2) = \ln(2)$

SIIS  $k = \ln(2)$

⑥  $y - y_1 = k(x - x_1)$  missä  $k = \text{kulmakertoimen}$

$y - 1 = \ln(2)(x - 0)$

$(x_1, y_1)$  suoran piste


$y - 1 = \ln(2)x$

$y = 1 + \ln(2)x$   
 $\approx 0.7$

$\rightarrow y = 1 + 0.7x$

13. Etsi funktion  $f(x) = x^3 + x^2$  käännepisteet.

- (a) Laske  $f'(x)$ .  
 (b) Laske  $f''(x)$ .  
 (c) Merkitse  $f''(x) = 0$  ja ratkaise  $x$ .



Solution  $3x + 2$   
 Solution  $x = -2/3$

14. Etsi funktion  $f(x) = e^{-x^2/2}$  käännepisteet.

- (a) Laske  $f'(x)$ .  
 (b) Laske  $f''(x)$ .  
 (c) Merkitse  $f''(x) = 0$  ja ratkaise  $x$ .

Solution  $e^{-x^2/2}(x^2 - 1)$   
 Solution  $x = \pm 1$

EI VIELÄ

OSATA LASKEA KÄSIN

JURKIN KOHTA

13. Etsi funktion  $f(x) = x^3 + x^2$  käännepisteet.

- (a) Laske  $f'(x)$ .  
 (b) Laske  $f''(x)$ .  
 (c) Merkitse  $f''(x) = 0$  ja ratkaise  $x$ .

Solution  $3x + 2$   
 Solution  $x = -2/3$


RATKAISU.



Input

$$y = x^3 + x^2$$

Plots



JYRKIN

ALAMÄKKI

AINOA

JYRKIN KOHTA

$$f(x) = x^3 + x^2$$

$$(a) f'(x) = 3x^2 + 2x$$

$$(b) f''(x) = 6x + 2$$

$$(c) 6x + 2 = 0$$

$$6x = -2$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

$$x \approx -0.33$$

16. Laske sijoitukset. Integraalit kertovat eräiden tasoalueiden pinta-alat. Tasoalueet on piirretty alla oleviin kuviin.

$$(a) \int_0^2 e^x = \int_0^2 e^x$$

Solution 6.3891


$$(b) \int_0^1 e^{2x} dx = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{2}$$

Solution 3.19

$$(c) \int_0^1 2x \cdot e^{x^2} = \int_0^1 e^{x^2}$$

Solution 1.7183

$$16.b) \int_0^1 e^{2x} dx = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{2}$$




TARKISTUS.  $\frac{e^{2x}}{2} = \frac{e^{2x} \cdot 2}{2} = e^{2x}$

$$\Delta 2^x = 2^x \ln(2)$$

$$\Delta e^x = e^x \quad \left| \int e^x dx = e^x \right| \quad \int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln(2)}$$

$$16.b) \int_0^1 e^{2x} dx = \int_0^1 \frac{e^{2x}}{2} = \frac{e^{2 \cdot 1}}{2} - \frac{e^{2 \cdot 0}}{2}$$

$$= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \stackrel{\text{LASKIN}}{=} \underline{\underline{3.19}}$$



OK ALA NOLIN 3.19

# VIIKON AIHEET KIRJASSA

|                   |                                                      |            |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapter 10</b> | <b>Differentiation</b>                               | <b>356</b> |
| 10.1              | Introduction                                         | 356        |
| 10.2              | Graphical approach to differentiation                | 357        |
| 10.3              | Limits and continuity                                | 358        |
| 10.4              | Rate of change at a specific point                   | 362        |
| 10.5              | Rate of change at a general point                    | 364        |
| 10.6              | Existence of derivatives                             | 370        |
| 10.7              | Common derivatives                                   | 372        |
| 10.8              | Differentiation as a linear operator                 | 375        |
|                   | Review exercises 10                                  | 385        |
| <b>Chapter 11</b> | <b>Techniques of differentiation</b>                 | <b>386</b> |
| 11.1              | Introduction                                         | 386        |
| 11.2              | Rules of differentiation                             | 386        |
| 11.3              | Parametric, implicit and logarithmic differentiation | 393        |
| 11.4              | Higher derivatives                                   | 400        |
|                   | Review exercises 11                                  | 404        |
| <b>Chapter 12</b> | <b>Applications of differentiation</b>               | <b>406</b> |
| 12.1              | Introduction                                         | 406        |
| 12.2              | Maximum points and minimum points                    | 406        |
| 12.3              | Points of inflexion                                  | 415        |
| 12.4              | The Newton–Raphson method for solving equations      | 418        |
| 12.5              | Differentiation of vectors                           | 423        |
|                   | Review exercises 12                                  | 427        |
| <b>Chapter 13</b> | <b>Integration</b>                                   | <b>428</b> |
| 13.1              | Introduction                                         | 428        |
| 13.2              | Elementary integration                               | 429        |
| 13.3              | Definite and indefinite integrals                    | 442        |
|                   | Review exercises 13                                  | 453        |

14. Etsi funktion  $f(x) = e^{-x^2/2}$  käännepisteet.

- (a) Laske  $f'(x)$ .  
 (b) Laske  $f''(x)$ .  
 (c) Merkitse  $f''(x) = 0$  ja ratkaise  $x$ .


$$\begin{aligned}
 f(x) &= e^{-x^2/2} \\
 f'(x) &= e^{-x^2/2} \cdot \frac{-2x}{2} \\
 f'(x) &= -x e^{-x^2/2} \\
 f''(x) &= -1 e^{-x^2/2} + (-x)(-x) e^{-x^2/2} \\
 &= e^{-x^2/2} (x^2 - 1) = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (fg)' &= f'g + fg'
 \end{aligned}$$

$$= \underbrace{e^{-\frac{x^2}{2}}}_{\neq 0} (x^2 - 1) = 0$$


$$x^2 = 1 \quad || \sqrt{\phantom{x}}$$

$$\underline{\underline{x = \pm 1}}$$



## LÄPIPÄÄSY TÄNTTI

1. Laske funktion  $f(x) = 4\sin(x) - \cos(2x)$  keskimääräinen muutosnopeus välillä  $[0, 2]$ .



2. Laske  $f'(x)$ , kun

(a)  $f(x) = 4x^5 - \sqrt{2x} + \frac{1}{x^3}$

(b)  $f(x) = 2\sin(3x) - 7e^{x^4}$


(c)  $f(x) = e^x \ln(x)$

$$f'(x) = e^x \ln(x) + e^x \frac{1}{x}$$

KAAVAT

$$20x^4 - \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{x}} - 3\frac{1}{x^4}$$

$$6\cos(3x) - 7e^{x^4} \cdot 4x^3$$



$$k = f'(0)$$

$$= 3^0 \ln(3)$$

$$= \ln(3)$$

$$y - y_1 = k(x - x_1)$$

$$y = 1 + \ln(3)x$$

Kuva 1: Funktion kuvaaja, tangenttisuora ja pinta-ala. Ruudun leveys ja korkeus ovat 1.

3. Selvitä Kuvassa 1 olevan suoran  $y = kx + b$  yhtälö.

4. Selvitä Kuvassa 1 olevan variostetun alueen pinta-ala.

3. Selvitä Kuvassa 1 olevan suoran  $y = kx + b$  yhtälö.

4. Selvitä Kuvassa 1 olevan varjostetun alueen pinta-ala.

$$\int_0^1 3^x dx = \int_0^1 \frac{3^x}{\ln(3)} = \frac{3^1 - 3^0}{\ln(3)} = \frac{3 - 1}{\ln(3)} = \frac{2}{\ln(3)} \approx 2.73$$

5. Uima-altaan tilavuuden tulee olla 256 kuutiometriä. Altaan pohja on neliön muotoinen ja seinät pystysuorat. Suunnittele altaan mitoitus niin, että kaakelia kuluu mahdollisimman vähän, kun seinät ja pohja kaakeloidaan. Toisin sanoen minimoi seinien ja pohjan yhteenlaskettu pinta-ala.

6. Laske

(a)  $\int 4x + \sqrt{x} dx$

$$\rightarrow 2x^2 + \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$$


(b)  $\int \cos(2x) dx$

$$\frac{\sin(2x)}{2}$$

(c)  $\int_2^3 e^{-x} + 1 dx$

$$\left[ -e^{-x} + x \right]_2^3 = (-e^{-3} + 3) - (-e^{-2} + 2)$$

5. Uima-altaan tilavuuden tulee olla 256 kuutiometriä. Altaan pohja on neliön muotoinen ja seinät pystysuorat. Suunnittele altaan mitoitus niin, että kaakelia kuluu mahdollisimman vähän, kun seinät ja pohja kaakeloidaan. Toisin sanoen minimoi seinien ja pohjan yhteenlaskettu pinta-ala.



$$V = x^2 h = 256$$

$$\Rightarrow h = \frac{256}{x^2}$$

$$A = 4xh + x^2$$

$$A(x)$$

$$A(x) = 1024 x^{-1} + x^2$$

$$A'(x) = 0 \Rightarrow x = \dots \Rightarrow h = \dots$$

$$A'(x) = -1024 x^{-2} + 2x = 0$$

$$2x^{-2} \left( -\frac{1024}{512} + x^3 \right) = 0$$

$$x^3 = \frac{1024}{512} = 2$$

VAS

$$h = \frac{256}{x^2} = \frac{256}{2^2} = 64$$


$$x = \sqrt[3]{2} \approx 1.26$$

$$h = \sqrt[3]{x^2}$$

$$= \frac{256}{64} = 4$$

$$x = 512^{\frac{1}{3}} = 8$$

↑  
Lasku



$$x^2 - 2x + 3 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= x^2 \\ b &= -2 \\ c &= 3 \end{aligned} \quad \leftarrow \text{VIRHE}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} =$$

$$\begin{aligned} \text{VIRHE} \rightarrow & \quad = \frac{-2 \pm \sqrt{-2^2 - 4 \cdot x^2 \cdot 3}}{2 \cdot x^2} \\ & \quad \quad \quad \text{VIRHE} \end{aligned}$$

## KERTTÄUSTÄ

$$D x^2 = 2x^{2-1} = 2x$$

$$D x = 1$$

$$D \text{ vakio} = 0$$

$$D \sqrt{x} = D x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$$

$$D \frac{1}{x^2} = D x^{-2} = -2x^{-3}$$

$$\int 2x' dx = \frac{2x^2}{2} = x^2$$

$$x^2 \xrightarrow{D} 2x \xrightarrow{\int} dx$$

$$D e^x = e^x \ln(e)$$

$$D a^x = a^x \ln(a)$$

$$D e^{2x} = e^{2x} D(2x)$$

$$\text{vakio} = e^{2x} \cdot 2$$

$$D e^{9x} = 9e^{9x}$$

ESIM.

$$D 2^x = 2^x \ln(2)$$

$$\ln(e^x) = x$$

$$e^{\ln(x)} = x$$

VAIHDETTAN  
KANTAVUUS

$$D e^{\ln(2^x)} = D e^{x \ln(2)}$$

$$= D e^{x \ln(2)} = e^{x \ln(2)} \cdot \ln(2)$$

$2^x$  KIRJOITETTUNA  
ERI TAVALLA

$$= 2^x \ln(2)$$

JOS EI  
TYKKÄÄ

JOISTAKIN  
KANTALUVUISTA,  
ESIM.

$$7^x = e^{x \ln(7)}$$

$$\log_7(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(7)}$$

NIIN NÄMÄ

VOI KIRJOITTA VAIKKA

RIITÄÄ

$$e \& \ln()$$

AVULLA

LOGARITMIN DERIVOINTI JA  
INTEGROINTI

$$x > 0$$

$$D \ln(x) = \frac{1}{x} \quad \leftrightarrow \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln(x)$$

$$\left( \int \ln(x) dx = x \ln(x) - x \right)$$

MUT  
LOGARITMIT  $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$

ESIM.  $D \ln(x^2 + 3x) = \frac{1}{(x^2 + 3x)} D(x^2 + 3x)$

DERIVATTA

$$D \ln(f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2x + 3}{x^2 + 3x}$$

$$D \ln(x^7) = \frac{D x^7}{x^7} = \frac{7x^6}{x^7} = \frac{7}{x}$$

TAPA 2

$$D \ln(x^7) = 7 D \ln(x) = 7 \cdot \frac{1}{x} = \frac{7}{x}$$

$$D \ln(\sqrt{x}) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$$

$$D \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

TAPA 2

$$= \frac{1}{2\sqrt{x} \sqrt{x}}$$

$$D \ln \sqrt{x} = \frac{1}{2x}$$

$$= D \ln x^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} D \ln(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{2x}$$

$$D \log_2(x^2 + 1)$$

$$= \frac{D \ln(x^2 + 1)}{\ln(2)} = \frac{1}{\ln(2)} D \ln(x^2 + 1) = \frac{1}{\ln(2)} \cdot \frac{2x + 0}{(x^2 + 1)}$$

FUNKTION  
POTENSSIN INTEGRANT

$$D x^n = n x^{n-1}$$

$$D f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x) \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$



$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$D(f(x))^n = n f(x)^{n-1} f'(x)$$

$$\int f'(x) f(x)^n dx = \frac{f(x)^{n+1}}{n+1}$$

VOI käyttää  
jos  
 $n+1 \neq 0$   
eli  $n \neq -1$


$$\neq f(x)^{-1} = \frac{1}{f(x)}$$

$$\int f'(x) \frac{1}{f(x)} dx = \ln(f(x))$$

ESIM.  $\int \underbrace{2x}_{f'(x)} \underbrace{(x^2+2)^7}_{f(x)} dx = \frac{(x^2+2)^8}{8}$

$$\int \frac{\underbrace{2x}_{f'(x)}}{\underbrace{x^2+2}_{f(x)}} dx = \ln(x^2+2)$$

### 3.2 Logaritmifunktion derivointi ja kuvaaja



3. Olkoon  $f(x) = \ln(x)$ . Laske

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| (a) $f'(x)$ | Solution $\frac{1}{x}$ |
| (b) $f'(1)$ | Solution 1             |
| (c) $f'(2)$ | Solution 0.5           |
| (d) $f'(3)$ | Solution 0.33          |
| (e) $f'(4)$ | Solution 0.25          |
| (f) $f'(5)$ | Solution 0.2           |

4. Selvitä funktion  $f(x) = \ln(x)$  kuvaajalle pisteeseen  $(1, 0)$  piirretyn tangenttisuoran

- |                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| (a) kulmakerroin | Solution 1                                 |
| (b) yhtälö.      | <del>Solution <math>y = x - 1</math></del> |

$$y = x - 1$$

1. Laske

- (a)  $D \ln(x^5)$   
(b)  $D \log_2(x^5)$

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$$

$$\log_a(x) = \frac{\log_e(x)}{\log_e(a)} = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

$$D \log_2(x^5) = D \frac{\ln(x^5)}{\ln(2)} = \frac{1}{\ln(2)} D \ln(x^5)$$

(a) - KOHTA

① MUUTETAAN

$$\log_2 \rightarrow \ln()$$

VAIKO, VOI VIERA  
DERIVOINNIN  
ULKOPUOLELLE

$$= \frac{1}{\ln(2)} \left( \frac{5}{x} \right)$$

LAISKUUS

integrate  $2x(x^2+1)^3 dx$

 NATURAL LANGUAGE

 MATH INPUT

 EXTENDED KEYBOARD

 EX

Indefinite integral

$$\int 2x(x^2+1)^3 dx = \frac{1}{4}(x^2+1)^4 + \text{constant}$$

2. Laske

(a)  $D \ln(\sqrt{x})$

(b)  $D \ln(1/x^2)$

(c)  $D \log_2(1/\sqrt{x})$

ESIM.

$$D \log_7(\sqrt[3]{x})$$

$$\textcircled{1} = D \log_7(x^{1/3})$$

$$\textcircled{2} = \frac{1}{3} D \log_7(x)$$

$$\textcircled{3} = \frac{1}{3 \ln(7)} D \ln(x)$$

$$= \frac{1}{3 \ln(7)} \cdot \frac{1}{x}$$

STRATEGIA

① KIRJOITA MUODOSSA  $x^p$ ,  
POTENSSEI  $p$   
NÄ KYVISSÄ.

②  $D \ln(x^p)$

VIE POTENSSEI ULLOS

③  $\log_2(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(2)}$

④  $\frac{p}{\ln(2)} \cdot \underbrace{D \ln(x)}_{= \frac{1}{x}} = \frac{p}{\ln(2)} \cdot \frac{1}{x}$   
SÄLÄÄ

KUVAAJA -ESIMERKKI

FUNKTION


$$f(x) = \log_5(\sqrt{x})$$

TANGENTIN  
YHTÄLÖ

$$= \frac{1}{2 \ln(5)} \cdot \ln(x)$$

KOHDASSA  $x=3$ .  $f'(x) = \frac{1}{2\ln(5)} \cdot \frac{1}{x}$   
 $k = f'(3) = \frac{1}{2\ln(5)} \cdot \frac{1}{3}$

$y = \frac{1}{2\ln(5)} \ln(x)$   $\approx 0,10355$




$y_1 = f(3) = \log_5(\sqrt{3}) = 0,3413$

$y - 0,3413 = 0,10355(x - 3)$   $-0,31$

$y = 0,3413 + 0,10355x - 0,10355 \cdot 3$

$y = 0,10355x + 0,03065$



$\int x^n dx$

$\int f'(x) (f(x))^n dx = \frac{f(x)^{n+1}}{n+1}$

5. Laske integraalit

# 5. Laske integraalit

(a)  $\int 2x(x^2 + 1)^3 dx$

(b)  $\int \frac{2x}{(x^2 + 1)^3} dx = \int \underbrace{2x}_{f'(x)} \underbrace{(x^2 + 1)^{-3}}_{f(x)} dx = \frac{(x^2 + 1)^{-3+1}}{-2}$   
 $= \frac{(x^2 + 1)^{-2}}{-2}$   
 $= \frac{1}{-2 (x^2 + 1)^2}$

# 6. Laske integraalit

(a)  $\int \frac{5x^4 + 1}{x^5 + x} dx$

partik,  $\ln(x^5 + x)$

(b)  $\int (5x^4 + 1)(x^5 + x)^7 dx$

(c)  $\int (5x^4 + 1)\sqrt{x^5 + x} dx$

6(b)  $\int \underbrace{(5x^4 + 1)}_{f'(x)} \underbrace{(x^5 + x)^7}_{f(x)} dx = \frac{(x^5 + x)^8}{8}$

Jos  $f(x) = x^5 + x^1$   
 niin  $f'(x) = 5x^4 + 1 \cdot x^0 = 5x^4 + 1$

6(c)  $\int (5x^4 + 1) \sqrt{x^5 + x} dx$   
 $= \int \underbrace{(5x^4 + 1)}_{f'(x)} \underbrace{(x^5 + x)^{\frac{1}{2}}}_{f(x)} dx = \frac{(x^5 + x)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}$   
 $= \frac{2}{3} (x^5 + x)^{\frac{3}{2}}$

TAR KISTUS

$$D \frac{2}{3} (x^5 + x)^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} (x^5 + x)^{\frac{3}{2} - 1} = \frac{2}{3} (x^5 + x)^{\frac{1}{2}}$$

$= \frac{2}{3} (x^5 + x)^{\frac{1}{2}}$

$$D \ln(f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

(f)  $D \log_2(3x)$

$$= D \frac{\ln(3x)}{\ln(2)} = \frac{1}{\ln(2)} D \ln(3x)$$

$D 3x = 3$

$$= \frac{1}{\ln(2)} \frac{3}{3x} = \frac{1}{\ln(2)} \frac{1}{x}$$

TAPA 2

$$D \log_2(3x) = \frac{1}{\ln(2)} D \ln(3x)$$

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

$$= \frac{1}{\ln(2)} (0 + \frac{1}{x})$$

$$= D \underbrace{\ln(3)}_{\text{konstanta}} + \ln(x)$$

$$= 0 + \frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{\ln(2)} \cdot \frac{1}{x}$$

ETSI SEURAAVASTA LASKUSTA

KOLME VIRHETÄ

$$ax^2 + bx + c = 0$$

VIRHE 1

VIRHE 2

VIRHE 3

 $a \neq x^2$  VAIN  $a=1$ 

MIINUS VUOTOI

SULUT VUOTOIVAT

$$1 \cdot x^2 - 2x + 3 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot x^2 \cdot 3}}{2 \cdot x^2}$$

$$a = \cancel{x^2} \quad 1$$

$$b = -2$$

$$c = 3$$

a, b JA c Ovat  
LUKUIJA,TÄNNE  
EI TULE  
X: ÄÄ

HUOM.  $-2^2 = -(2^2) = -4$

$$(-2)^2 = (-2)(-2) = +4$$

TÄNÄÄN


HARJOITELUUN  
KOKO  
LISÄÄ

SUURENNE (RADIAANIT)

$$\begin{cases} D \sin(x) = \cos(x) > 0 \\ D \cos(x) = -\sin(x) < 0 \end{cases}$$

KUVAN  
MUKAAN  
PIENENEÄ,  
KUN  
x KASVAA

$$\frac{3}{4} > \frac{3}{5}$$



$$D f(x)g(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$D \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

$$\begin{aligned} D fg &= f'g + fg' \\ D \frac{f}{g} &= \frac{f'g - fg'}{g^2} \end{aligned}$$

②

| Potenssin derivaatta                                             | Trigonometristen funktioiden derivaatat          | Arkusfunktioiden derivaatat                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $Dx^n = nx^{n-1}$ , missä $n \in \mathbb{Z}$                     | $D \sin x = \cos x$                              | $D \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                           |
| $D\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ [2]                            | $D \cos x = -\sin x$                             | $D \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                          |
| $D\sqrt[3]{x} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$                        | $D \tan x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$   | $D \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$                                  |
| $D\sqrt[n]{x} = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$                    | $D \cot x = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x$ | $D \operatorname{arccot} x = -\frac{1}{1+x^2}$                   |
| Eksponttifunktion derivaatta                                     | Hyperbolisten funktioiden derivaatat             | Hyperbolisten käänteisfunktioiden eli areafunktioiden derivaatat |
| $De^x = e^x$                                                     | $D \sinh x = \cosh x$                            | $D \operatorname{arsinh} x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$             |
| $Da^x = a^x \ln a$ , missä $a > 0$                               | $D \cosh x = \sinh x$                            | $D \operatorname{arcosh} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$             |
|                                                                  | $D \tanh x = \frac{1}{\cosh^2 x}$                | $D \operatorname{artanh} x = \frac{1}{1-x^2}$                    |
| Logaritmifunktioiden derivaatat                                  |                                                  |                                                                  |
| $D \ln  x  = \frac{1}{x}$                                        |                                                  |                                                                  |
| $D \log_a  x  = \frac{1}{x \ln a}$ , missä $a > 0$ ja $a \neq 1$ |                                                  |                                                                  |

| Säännön nimi                   | Derivointisääntö                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vakion derivaatta              | $Dc = 0$ , kun $c$ on vakio. [4]                                                    |
| Vakion siirto                  | $Dcf(x) = cDf(x)$ [1][4]                                                            |
| Summan derivaatta              | $D(f(x) + g(x)) = Df(x) + Dg(x)$ [1][10][4]                                         |
| Tulon derivaatta               | $D(f(x)g(x)) = g(x)Df(x) + f(x)Dg(x)$ [1][12][13][4]                                |
| Funktion potenssin derivaatta  | $Df(x)^n = n f(x)^{n-1} f'(x)$ [12][14]                                             |
| Osamäärän derivaatta           | $D \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{g(x)Df(x) - f(x)Dg(x)}{g(x)^2}$ [14][13][4]            |
| Yhdistetyn funktion derivaatta | $Dg(f(x)) = g'(f(x))f'(x)$ [4]                                                      |
| Käänteisfunktion derivaatta    | $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$ , jossa $f^{-1}$ on $f$ :n käänteisfunktio. [4] |

TÄNÄIN

## SININ JA KOSININ DERIVOINTIA

$$D \sin(x) = \cos(x)$$

$$D e^{x^7} = e^{x^7} \cdot D x^7 = e^{x^7} \cdot 7x^6$$

$$D \sin(x^7) = \cos(x^7) \cdot D x^7 = \underline{\underline{\cos(x^7) \cdot 7x^6}}$$

$$D (\sin(x))^7 = 7 (\sin(x))^6 \cdot D \sin(x) \\ = \underline{\underline{7 (\sin(x))^6 \cos(x)}}$$

$$\left[ \begin{array}{l} D \sin(x) = \cos(x) \\ D \cos(x) = -\sin(x) \\ D e^x = e^x \\ D \ln(x) = \frac{1}{x} \end{array} \right.$$

$$\left[ \begin{array}{l} D 2^x = 2^x \ln(2) \\ D \log_2(x) = \frac{1}{\ln(2)} D \ln(x) \end{array} \right.$$

$$D e^{\sin(x)} = e^{\sin(x)} \cdot \frac{D \sin(x)}{= \cos(x)}$$

$$D e^{\cos(x)} = e^{\cos(x)} \cdot \frac{D \cos(x)}{= -\sin(x)} = e^{\cos(x)} (-\sin(x))$$



$$D \sin(e^x) = \cos(e^x) \cdot D e^x = \cos(e^x) e^x$$

$$D \cos(e^{x^3}) = -\sin(e^{x^3}) \cdot \underbrace{D e^{x^3}}_{e^{x^3} \cdot 3x^2} = -3x^2 e^{x^3} \sin(e^{x^3})$$

$$D \ln(\sin(x)) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

$$D \ln(\cos(x)) = \frac{-\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$D x^7 \cos(3x)$$

$$D fg = f'g + fg'$$

$$= 7x^6 \cos(3x) + x^7 \left( -\sin(3x) \cdot \underbrace{D 3x}_{=3} \right)$$

$$D \frac{x^7}{\sin(4x)}$$

$$D \frac{f}{g} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$= \frac{7x^6 \sin(4x) - x^7 \cdot \cos(4x) \cdot \underbrace{D 4x}_{=4}}{(\sin(4x))^2}$$

$$= \frac{7x^6 \sin(4x) - 4x^7 \cos(4x)}{\sin^2(4x)}$$

3. Laske derivaatta.

(a)  $f(x) = 2e^{\sin(7x)}$

(b)  $g(x) = 3e^{2\cos(2x)}$

(c)  $h(x) = -2e^{-\cos(5x)}$

Solution  $f'(x) = 14e^{\sin(7x)} \cos(7x)$

Solution  $g'(x) = -12e^{2\cos(2x)} \sin(2x)$

Solution  $h'(x) = -10e^{-\cos(5x)} \sin(5x)$

3. (b)  $g(x) = 3e^{2\cos(2x)}$

$$\begin{aligned} g'(x) &= D(3)e^{2\cos(2x)} = 3e^{2\cos(2x)} \cdot D(2\cos(2x)) \\ &= 3 \cdot 2e^{2\cos(2x)} \underbrace{D(\cos(2x))}_{= -\sin(2x) \cdot \underbrace{D(2x)}_{= 2}} \\ &= -12e^{2\cos(2x)} \sin(2x) \end{aligned}$$

4. Derivoi

(a)  $D \sin^7(x)$

(b)  $D \cos^3(x)$

(c)  $D \sin^5(2x)$

(d)  $D \frac{1}{\sin^2(3x)}$

(e)  $D \sqrt{\cos(4x)}$

Solution  $7 \sin^6(x) \cos(x)$

Solution  $-3 \cos^2(x) \sin(x)$

Solution  $10 \sin^4(2x) \cos(2x)$

Solution  $-6(\sin(3x))^{-3} \cos(3x)$

Solution  $-2(\cos(4x))^{-1/2} \sin(4x)$

4. (c)  $D(\sin(2x))^5$

$$\begin{aligned} &= 5(\sin(2x))^4 \cdot \underbrace{D \sin(2x)}_{= \cos(2x) \cdot \underbrace{D(2x)}_{= 2}} \\ &= 5(\sin(2x))^4 \cdot \cos(2x) \cdot 2 \end{aligned}$$

$D \sqrt{x} = D x^{\frac{1}{2}}$

4. Derivoi

(a)  $D \sin^7(x)$

(b)  $D \cos^3(x)$

(c)  $D \sin^5(2x)$

$\frac{1}{\sin^2(3x)} = \sin^{-2}(3x)$

- (a)  $D \sin(x)$   
 (b)  $D \cos^3(x)$   
 (c)  $D \sin^5(2x)$   
 (d)  $D \frac{1}{\sin^2(3x)}$   
 (e)  $D \sqrt{\cos(4x)}$

$$4.d) D \frac{1}{\sin^2(3x)} = D \frac{1}{(\sin(3x))^2}$$

$$= D (\sin(3x))^{-2}$$

$$= -2 (\sin(3x))^{-3} \cos(3x) \cdot 3$$


---

$$4.e) D \sqrt{\cos(4x)} = D (\cos(4x))^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} (\cos(4x))^{-\frac{1}{2}} (-\sin(4x)) \cdot 4$$

$$= -2 (\cos(4x))^{-\frac{1}{2}} \sin(4x)$$


---

RATKAISUJA

5. Derivoi

- (a)  $Dx^7 \cos(2x)$   
 (b)  $Dx^3 e^x$   
 (c)  $Dx^5 \ln(x)$   
 (d)  $D \sin(x) \ln(x)$   
 (e)  $De^{2x} \cos(3x)$

$$7x^6 \cos(2x) - 2x^7 \sin(2x)$$

$$3x^2 e^x + x^3 e^x$$

$$5x^4 \ln(x) + x^5$$

$$\cos(x) \ln(x) + \frac{\sin(x)}{x}$$

$$2e^{2x} \cos(3x) - 3e^{2x} \sin(3x)$$

6. Derivoi

- (a)  $D \frac{x^7}{\cos(2x)} = \frac{7x^6 \cos(2x) + 2x^7 \sin(2x)}{(\cos(2x))^2}$   
 (b)  $D \frac{x^3}{e^x}$   
 (c)  $D \frac{x^5}{\ln(x)}$   
 (d)  $D \frac{\sin(x)}{\ln(x)}$   
 (e)  $D \frac{e^{2x}}{\cos(3x)}$

ESIM.

$$D (\sin(2x))^5 = 5(\sin(2x))^4 \cdot \cos(2x) \cdot 2$$


---

$$n=4$$

$$(*) \frac{d}{dx} \sin^n(x) = n \sin^{n-1}(x) \cos(x)$$

HEIM

ESIM.

$n=4$

$$\textcircled{*} \int f'(x) f(x)^n dx = \frac{f(x)^{n+1}}{n+1}$$

$$\int \cos(2x) (\sin(2x))^4 dx$$

$f(x)$

$$= \frac{1}{2} \int \underbrace{2 \cos(2x)}_{f'(x)} \underbrace{(\sin(2x))^4}_{f(x)} dx$$

$f(x) = \sin(2x)$   
 $f'(x) = \cos(2x) \cdot \underbrace{2}_{\text{АНАА ТАР НТААН } 2}$

$$\textcircled{*} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(\sin(2x))^5}{5} = \frac{(\sin(2x))^5}{10}$$

5. Derivoi

- (a)  $Dx^7 \cos(2x)$
- (b)  $Dx^3 e^x$
- (c)  $Dx^5 \ln(x)$
- (d)  $D \sin(x) \ln(x)$
- (e)  $De^{2x} \cos(3x)$

$$Dfg = f'g + fg'$$

5. (c)  $D x^5 \ln(x)$

$$= 5x^4 \ln(x) + \underbrace{x^5 \cdot \frac{1}{x}}_{\frac{x^5}{x'} = x^4}$$

$$= \underline{\underline{5x^4 \ln(x) + x^4}}$$

## 5 trigonometriset funktiot ratkaisut

keskiviikko 10. huhtikuuta 2024 10.17

### 1. Laske derivaatta.

(a)  $f(x) = \sin(7x)$

(b)  $g(x) = \cos(7x)$

(c)  $h(x) = \sin(2 - 3x)$

Solution  $f'(x) = 7 \cos(7x)$

Solution  $g'(x) = -7 \sin(7x)$

Solution  $h'(x) = -3 \cos(2 - 3x)$

$$\begin{aligned}
 1. \textcircled{a} \quad & D \sin(7x) = \cos(7x) \cdot D(7x) \\
 & \quad \quad \quad = \underline{\underline{\cos(7x) \cdot 7}} \\
 \textcircled{b} \quad & D \cos(7x) = \underline{\underline{-\sin(7x) \cdot 7}} \\
 \textcircled{c} \quad & D \sin(2 - 3x) = \cos(2 - 3x) \cdot D(2 - 3x) \\
 & \quad \quad \quad = \underline{\underline{-3 \cos(2 - 3x)}}
 \end{aligned}
 \left. \begin{aligned}
 & D \sin(x) = \cos(x) \\
 & D \cos(x) = -\sin(x)
 \end{aligned} \right\}
 \begin{aligned}
 & \quad \quad \quad = 0 - 3 \cdot 1 = -3
 \end{aligned}$$

### 2. Laske derivaatta.

(a)  $f(x) = \sin(x^7)$

(b)  $g(x) = \cos(x^7)$

(c)  $h(x) = \sin(x^{-3})$

Solution  $f'(x) = 7x^6 \cos(x^7)$

Solution  $g'(x) = -7x^6 \sin(x^7)$

Solution  $h'(x) = -3x^{-4} \cos(x^{-3})$

$$\begin{aligned}
 2. \textcircled{a} \quad & D \sin(x^7) = \underline{\underline{\cos(x^7)}} \cdot \underbrace{D x^7}_{= 7x^6} = \underline{\underline{7x^6 \cos(x^7)}} \\
 \textcircled{b} \quad & D \cos(x^7) = -7x^6 \sin(x^7) \\
 \textcircled{c} \quad & D \sin(x^{-3}) = \underline{\underline{\cos(x^{-3})}} \cdot \underbrace{D x^{-3}}_{= -3x^{-4}} \\
 & \quad \quad \quad \left[ = -3 \frac{\cos\left(\frac{1}{x^3}\right)}{x^4} \right]
 \end{aligned}$$

3. Laske derivaatta.

- (a)  $f(x) = 2e^{\sin(7x)}$   
 (b)  $g(x) = 3e^{2\cos(2x)}$   
 (c)  $h(x) = -2e^{-\cos(5x)}$

Solution  $f'(x) = 14e^{\sin(7x)} \cos(7x)$

Solution  $g'(x) = -12e^{2\cos(2x)} \sin(2x)$

Solution  $h'(x) = -10e^{-\cos(5x)} \sin(5x)$

3(a)  $\curvearrowright 2e^{\sin(7x)}$

$= 2e^{\sin(7x)} \cdot \underbrace{D \sin(7x)}_{= 7\cos(7x)}$

$= \underline{\underline{14 e^{\sin(7x)} \cos(7x)}}$

$D \sin(x) = \cos(x)$

$D \cos(x) = -\sin(x)$

$D e^x = e^x$

(b)  $D 3e^{2\cos(2x)} = \underline{\underline{-12 e^{2\cos(2x)} \sin(2x)}}$

(c)  $D -2e^{-\cos(5x)} = (-2)(-1) \cdot 5 e^{-\cos(5x)} (-\sin(5x))$   
 $= \underline{\underline{-10 e^{-\cos(5x)} \sin(5x)}}$

derivative of  $-2 \cdot \exp(-\cos(5 \cdot x))$

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

Derivative

$\frac{d}{dx}(-2 \exp(-\cos(5x))) = -10 \sin(5x) e^{-\cos(5x)}$

$[\sin(ax)]^p$

4. Derivoi

- (a)  $D \sin^7(x)$   
 (b)  $D \cos^3(x)$   
 (c)  $D \sin^5(2x)$   
 (d)  $D \frac{1}{\sin^2(3x)}$   
 (e)  $D \sqrt{\cos(4x)}$

Solution  $7 \sin^6(x) \cos(x)$

Solution  $-3 \cos^2(x) \sin(x)$

Solution  $10 \sin^4(2x) \cos(2x)$

Solution  $-6(\sin(3x))^{-3} \cos(3x)$

Solution  $-2(\cos(4x))^{-1/2} \sin(4x)$

$$4.a) D(\sin(x))^7 = 7(\sin(x))^6 \cdot D\sin(x) \\ = 7(\sin(x))^6 \cos(x)$$

$$b) D(\cos(x))^3 = -3(\cos(x))^2 \sin(x)$$

$$D 2x' \\ = 2 \cdot 1 \cdot \underbrace{x^0}_{=1} = 2$$

$$c) D(\sin(2x))^5 = 5(\sin(2x))^4 \cdot D\sin(2x) \\ = 10(\sin(2x))^4 \cos(2x) = \cos(2x) \cdot \underbrace{D(2x)}_{=2}$$

$$d) D(\sin(3x))^{-2} = -2(\sin(3x))^{-3} \cdot \cos(3x) \cdot 3$$

$$e) D \cos(4x)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (\cos(4x))^{-\frac{1}{2}} \cdot (-\sin(4x)) \cdot 4 \\ = \frac{-2 \sin(4x)}{\sqrt{\cos(4x)}}$$

Kahden funktion tulon derivaatan voi laskea kaavalla<sup>1</sup>

$$D(fg) = gDf + fDg.$$

Kahden funktion osamäärän derivaatan voi laskea kaavalla<sup>2</sup>

$$D\frac{f}{g} = \frac{gDf - fDg}{g^2}.$$

**Esimerkki.**  $Dx^3 \sin(5x) = 3x^2 \cdot \sin(5x) + x^3 \cdot 5 \cos(5x)$

5. Derivoi

(a)  $Dx^7 \cos(2x)$

Solution  $7x^6 \cos(2x) - 2x^7 \sin(2x)$

(b)  $Dx^3 e^x$

Solution  $3x^2 e^x + x^3 e^x$

(c)  $Dx^5 \ln(x)$

Solution  $5x^4 \ln(x) + x^4$

(d)  $D \sin(x) \ln(x)$

Solution  $\cos(x) \ln(x) + \frac{\sin(x)}{x}$

(e)  $De^{2x} \cos(3x)$

Solution  $2e^{2x} \cos(3x) - 3e^{2x} \sin(3x)$

$$5.a) D x^7 \cos(2x),$$

$$5. a) \quad D x^7 \cos(2x)$$

$$= 7x^6 \cos(2x) + x^7 (-\sin(2x)) \cdot 2$$

$$b) \quad D x^3 e^x$$

$$= 3x^2 e^x + x^3 e^x$$

$$D \ln(x) = \frac{1}{x}$$

$$c) \quad D x^5 \ln(x)$$

$$= 5x^4 \ln(x) + x^5 \cdot \frac{1}{x} = 5x^4 \ln(x) + x^4$$

$$d) \quad D \sin(x) \ln(x)$$

$$= \cos(x) \ln(x) + \frac{\sin(x)}{x}$$

$$e) \quad D e^{2x} \cos(3x)$$

$$= 2e^{2x} \cos(3x) + e^{2x} (-\sin(3x)) \cdot 3$$

6. Derivoi

$$(a) \quad D \frac{x^7}{\cos(2x)}$$

$$\text{Solution} \quad \frac{7x^6 \cos(2x) + 2x^7 \sin(2x)}{\cos^2(2x)}$$

$$(b) \quad D \frac{x^3}{e^x}$$

$$\text{Solution} \quad \frac{3x^2 e^x - x^3 e^x}{e^{2x}}$$

$$(c) \quad D \frac{x^5}{\ln(x)}$$

$$\text{Solution} \quad \frac{5x^4 \ln(x) - x^4}{\ln(x)^2}$$

$$(d) \quad D \frac{\sin(x)}{\ln(x)}$$

$$\text{Solution} \quad \frac{\cos(x) \ln(x) - \frac{\sin(x)}{x}}{\ln(x)^2}$$

$$(e) \quad D \frac{e^{2x}}{\cos(3x)}$$

$$\text{Solution} \quad \frac{2e^{2x} \cos(3x) + 3e^{2x} \sin(3x)}{\cos^2(3x)}$$

$$n \quad (e^{2x}) \quad - \quad 2e^{2x} \cos(3x) - e^{2x} \sin(3x) \cdot 3$$

$\cdot \frac{D 3x}{= 3}$



$$D \frac{e^{2x}}{\cos(3x)} = \frac{2e^{2x} \cos(3x) - e^{2x} (-\sin(3x)) \cdot 3}{(\cos(3x))^2}$$

7. Laske  $D \tan(x) = D \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ .

Solution  $\frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}$

8. Laske  $D \cot(x) = D \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$ .

Solution  $\frac{-\cos^2(x) - \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = -\frac{1}{\sin^2(x)}$

9. Laske  $D \ln(\sin(2x))$ .

Solution  $\frac{2 \cos(2x)}{\sin(2x)}$


10. Laske  $D \ln(2 \cos(2x))$ .

$D \sqrt{x} = D x^{\frac{1}{2}}$

Solution  $\frac{-\sin(2x)}{\cos(2x)}$

$D x^n = n x^{n-1}$

7.  $D \tan(x) = D \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$



$$= \frac{\cos(x) \cos(x) - \sin(x) (-\sin(x))}{(\cos(x))^2}$$

PYTHAGORAS  $\frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1^2}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}$

$D \tan(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$   
 $D \cot(x) = -\frac{1}{\sin^2(x)}$

$\cot(\alpha) = \frac{b}{a}$   $\tan(\alpha) = \frac{a}{b}$

KO TANGENTTI

8.  $D \cot(x) = D \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$

TANGENTTI

$$= \frac{-\sin(x) \cdot \sin(x) - \cos(x) \cdot \cos(x)}{\sin^2(x)}$$

$$= \frac{-\sin(x) \cdot \sin(x) - \cos(x) \cdot \cos(x)}{\sin^2(x)}$$

$$= - \frac{\sin^2(x) + \cos^2(x)}{\sin^2(x)} = - \frac{1}{\sin^2(x)}$$

7. Laske  $D \tan(x) = D \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ .

Solution  $\frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}$

8. Laske  $D \cot(x) = D \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$ .

Solution  $\frac{-\cos^2(x) - \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = -\frac{1}{\sin^2(x)}$

9. Laske  $D \ln(\sin(2x))$ .

Solution  $\frac{2 \cos(2x)}{\sin(2x)}$

10. Laske  $D \ln(2 \cos(2x))$ .

Solution  $\frac{-\sin(2x)}{\cos(2x)}$

9.  $D \ln(\sin(2x))$

$$= \frac{2 \cos(2x)}{\sin(2x)}$$

$D \ln(x) = \frac{1}{x}$

$D \ln(x^7) = \frac{7x^6}{x^7} = \frac{7}{x}$

10.  $D \ln(2 \cos(2x))$

$$= \frac{D 2 \cos(2x)}{2 \cos(2x)} = \frac{-\sin(2x) \cdot 2}{\cos(2x)}$$

11. Ison kondensaattorin<sup>4</sup> (kapasitanssi  $C = 0.001$  F) napojen välinen jännite on

$$u(t) = 15e^{-t} \text{ mV.}$$

Laske kondensaattorin läpi kulkeva virta hetkellä  $t = 1$  s.

Solution  $0.015e^{-1} \approx 0.0055 \text{ mA}$

12. Vaihtovirtapiirissä on virta  $i(t) = 5 \sin(5000 \cdot 2\pi t)$  mA. Virta kulkee käämin (induktanssi  $L = 0.0002$  H) läpi. Laske käämin napojen välinen maksimijännite olettaen, että käämin resistanssi on nolla.

Solution  $10 \text{ V}$

13. Laske integraalit

(a)  $\int \sin(x)(\cos(x))^3 dx$

Solution  $-\frac{1}{4}(\cos(x))^4$

(b)  $\int \frac{\cos(x)}{(\sin(x))^3} dx$

Solution  $\frac{1}{-2} \frac{1}{(\sin(x))^2}$

(c)  $\int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} dx$

Solution  $\ln(\sin(x))$

13. a)  $-\int \underbrace{\sin(x)}_{f'(x)} \underbrace{(\cos(x))^3}_{f(x)} dx$   
 $n=3$   
 $f'(x) = -\sin(x)$   
 $= -\frac{\cos(x)^4}{4}$

$$\int f'(x) f(x)^n dx = \frac{f(x)^{n+1}}{n+1}$$

$n \neq -1$

$$\int \frac{\cos(x)}{\sin(x)^3} dx = \int \underbrace{\cos(x)}_{f'(x)} \underbrace{\sin(x)^{-3}}_{f(x)} dx$$

$$= \frac{\sin(x)^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2\sin(x)^2}$$

$$\int \underbrace{\cos(x)}_{f'(x)} \underbrace{\frac{1}{\sin(x)}}_{f(x)} dx = \ln(\sin(x))$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x))$$

14. Laske integraalit

(a)  $\int (\cos(x))^3 (\sin(x))^7 dx$  Hint. Sijoita  $(\cos(x))^3 = \cos(x) - \cos(x)(\sin(x))^2$ .  
 $\frac{\sin^8(x)}{8} - \frac{\sin^{10}(x)}{10}$

Solution

(b)  $\int \tan(x) dx$  Hint. Sijoita  $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ .

Solution  $-\ln(\cos(x))$

(c)  $\int \sin(x) \sqrt{\cos(x)} dx$  Hint. Muista  $\sqrt{a} = a^{1/2}$ .

Solution  $-\cos(x)^{3/2}$

(d)  $\int 2 \sin(7x) \sin(3x) dx$  Hint. Käytä kaavaa  $2 \sin(a) \sin(b) = \cos(a-b) - \cos(a+b)$   
 $-\cos(4x)/4 + \cos(10x)/10$

Solution

14. a)  $\int (\cos(x) - \cos(x) \sin(x)^2) \sin(x)^7 dx$   
 $= \int \underbrace{\cos(x)}_{f'(x)} \underbrace{(\sin(x))^7}_{f(x)} dx - \cos(x) \sin(x)^9 dx$

$$= \int \underbrace{\cos(x)}_{f'(x)} \underbrace{(\sin(x))^8}_{f(x)} - \cos(x) \sin(x) \, dx$$

$$= \frac{\sin(x)^8}{8} - \frac{\sin(x)^{10}}{10}$$

14. (b)  $\int \tan(x) \, dx$

$$= - \int \frac{\sin(x)}{\underbrace{\cos(x)}_{f(x)}} \, dx$$

$$f'(x) = -\sin(x)$$

$$= - \ln(\cos(x))$$

$$\int \sqrt{x} \, dx$$

$$= \int x^{\frac{1}{2}} \, dx$$

TARKISEUS,  $D - \ln(\cos(x)) = + \frac{+\sin(x)}{\cos(x)}$   
ok

(c)  $\int \sin(x) \sqrt{\cos(x)} \, dx$

$$= - \int \underbrace{\sin(x)}_{f'(x)} \underbrace{\cos(x)^{\frac{1}{2}}}_{f(x)} \, dx = - \cos(x)^{\frac{3}{2}}$$

$$= - \cos(x) \sqrt{\cos(x)}$$

(d)  $\int 2 \sin(7x) \sin(3x) \, dx$

$$= \int \cos(7x - 3x) - \cos(7x + 3x) \, dx$$

$$= \int \cos(4x) - \cos(10x) \, dx$$

$$= \frac{\sin(4x)}{4} - \frac{\sin(10x)}{10}$$



---



---

## DERIVAATAN MÄÄRITELMÄ

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



$$k = \frac{\text{y:n muutos}}{\text{x:n muutos}} = \frac{f(x+h) - f(x)}{(x+h) - x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

KURSSIN DERIVOINTI -  
KAAVAT VOI TODISTAA  
TÄMÄN AVULLA

TÄLLÄ VIIKOLLA

ANNETAAN h:n

OLLA JOKIN LUKU, ESIM.  $h = 0.01$

$$f'(x) \approx \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

LIKIARVO  
DERIVAATALLE

ESIMERKKI. OLKoon  $f(x) = x e^{2x}$ .

LASKE  $f'(1)$

(a) KÄSIN TARKASTI

(b) LIKIARVONA KAAVALLA

RATKAISU. (a)  $f(x) = x e^{2x}$   $D(fg) = f'g + fg'$

$$f'(x) = 1 \cdot e^{2x} + x \cdot e^{2x} \cdot \underbrace{D(2x)}_{=2}$$

$$f'(x) = e^{2x}(1 + 2x)$$

$$f'(1) = e^{2 \cdot 1} (1 + 2 \cdot 1) = 3e^2 \approx 22.167$$

TARKKA  
DERIVAATAN  
ARVO

$$f(x) = \otimes e^{2x}$$

(b)  $f'(x) \approx \frac{f(\overbrace{x+h}^{1.01}) - f(\underbrace{x}_{=1})}{h}$

$h = 0.01$  (VALITTU  
ESIM.  
NÄIN)

$$= \frac{1.01 e^{2 \cdot 1.01} - 1 \cdot e^{2 \cdot 1}}{0.01}$$

$$\approx 22.46$$

ESIM. NÄIN)  
 $x = \text{TARKASTELOPISTE}$   
 $= 1$   
 $x+h = 1.01$

MELKO TÄRKEÄ  
 ARVOA 22,167

$$(1.01 \cdot \exp(2 \cdot 1.01) - 1 \cdot \exp(2 \cdot 1)) / 0.01$$

NATURAL LANGUAGE    MATH INPUT

Input  

$$\frac{1.01 \exp(2 \times 1.01) - 1 \exp(2 \times 1)}{0.01}$$

Result  
 22.4652...

(SUHTELLINEN VIRHE





$$\frac{22.46 - 22.167}{22.167} = 0.013$$

$$\approx 1.3\%$$

## NUMEERISTA INTEGROINTIA

IDEA : INTEGRATION ON JOKIN PINTA-ALA

→ ARVIOIDAAN PINTA-ALAA  
JOLLAKIN KUVIOILLA



NYKYÄÄN TIE TOKO NET

OVAT TEHO KKA TA  $\Rightarrow$  MIKÄ  
TALANSA

V, O, P, K

TOIMII HYVIN,

(KÄSIN LASKIESSA?)

SIMPSONIN MENETELMÄ

$$\frac{1 \cdot P + 2 \cdot K}{1 + 2}$$

PAINOTETTU

1+2


MENETELMISSÄ P & K,

KESKIARVO

Integraalia voidaan arvioida vasemman päätepisteen menetelmällä

$$\int_a^b f(x) dx \approx V = \sum_{k=1}^N \underbrace{f(x_{k-1})}_{\text{KORKEUS}} \underbrace{(x_k - x_{k-1})}_{\text{KANTA}}$$

SUORA -  
KULMIODIEN  
KANTA PINTA -  
ALOJEN  
SUMMA



ESIM.  $\int_1^1 x^2 dx$



ESIM.  $\int_0^1 x^2 dx$

$$= \int_0^1 \frac{x^3}{3} = \frac{1^3 - 0^3}{3} = \frac{1}{3} = 0.333...$$

NUMERISESTI

OK LIKIARVO

sum k=1 to k=100 x^2\*w where x=a+(b-a)\*k/100 and w=(b-a)/100 and a=0 and b=1

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

Input interpretation

$$\sum_{k=1}^{100} x^2 w \text{ where } x = a + (b-a) \times \frac{k}{100}, w = \frac{b-a}{100}, a=0, b=1$$

Result

$$\frac{6767}{20000}$$

$\approx 0.33835$

Enlarge

Data

Cust

Download Page

Mute Stop Video Security Participants Chat New share Pause Share Annotate

You are screen sharing

Stop share

POWERED BY T

octave:9> format long

```
a=0;
b=1;
N=100;
dx=(b-a)/N;
s=0;
for k=1:100
x=a+(b-a)*k/N;
s=s+x^2*dx;
end
s
```

s = 0.338350000000000

HYVIN

TAPA

LASKEA

ARVUINOSSA

integrate from x=0 to x=1 x^2

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

Definite integral

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \approx 0.33333$$

# DERIVAATAN SOVELLUS: TAYLORIN SARJA/

## TAYLORIN POLYNOMI

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

↑  
SILÄÄ/  
DERIVOIVUVA

$$\boxed{a=0}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

$$1! = 1$$

$$0! = 1$$

SARJOJA LÖYTÄÄ

TALUKKOKIRJASTA/WIKIPEDIASSA

ESIM.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

↓

↑  
SAMAT  
↓  
 $e^x$

$$e^x = 0 + 1 + \frac{2x}{1 \cdot 2} + \frac{3x^2}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{4x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots$$

↑  
SAMAT  
↓

$$1 \quad x \quad \frac{x^2}{2} \quad \frac{x^3}{3!}$$

$$\boxed{1 e^x = e^x}$$

HYÖTY?

KATKAISTAA

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \quad \text{kun } x \approx 0$$

TAYLORIN POLYNOMI

ESIM.  $e^2 = 1 + 2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{6}$

$$\begin{aligned}
 &= 1 + 2 + 2 + \frac{8}{6} \\
 &= 1 + \frac{8}{3} \quad \text{LASKIN} \\
 &= 6 + \frac{1}{3} \\
 &\approx \underline{\underline{6.33}}
 \end{aligned}$$

$e^2 \approx 7.38$

↑ EILHAN HUONO ↑

ESIM. INTEGRALU, JO TA EI VOIDA  
LASKEA TARKASTI KÄSIN  
← PUVTTU

$$\int_0^1 e^{x^2} dx$$

$$\int \underbrace{2x}_{g'(x)} \underbrace{e^{x^2}}_{f(g(x))} dx = e^{x^2}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{6}$$

$$\begin{aligned}
 &\approx \int_0^1 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{6} dx \\
 &= \left[ x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} + \frac{x^7}{42} \right]_0^1 \\
 &= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{10} + \frac{1}{42}
 \end{aligned}$$

LASKIN

1.462

OK

≈ 1.457

VEKTORIT

JA

KOMPLEKSI LUVUT

$$i = \sqrt{-1}$$

$$i^2 = -1$$

KOMPLEKSI LUVUT

$$i^2 = -1$$

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$$

PERUSTELU

TAYLORIN

SARJALLA (ESIM.)

1. (Viikolta 2) Olkoon  $f(x) = x^2 - 1$ . Laske numeerisesti

(a) (ohi  $f'(x)$ )

Solution  $2x$

(b)  $f'(-2)$

Solution  $-4$

(c)  $f'(-1)$

Solution  $-2$

(d)  $f'(0)$

Solution  $0$

(e)  $f'(1)$

Solution  $2$

(f)  $f'(2)$

Solution  $4$

(b)  $f'(-2) = ?$

$$\begin{cases} x = -2 \\ h = 0.01 \text{ (MITÄ PIENEMPI,} \\ \text{SITÄ TÄRKEMPI ARVO)} \\ x+h = -2 + 0.01 = -1.99 \end{cases}$$

OHJE

$$f'(x) \approx \frac{f(\overbrace{x+h}) - \underbrace{f(x)}}{h}$$

$x$  on tarkastelupiste ja  $h = 0.01$ .

$$f(x) = x^2 - 1$$

$$f'(-2) \approx \frac{f(-1.99) - f(-2)}{0.01} = \frac{((-1.99)^2 - 1) - ((-2)^2 - 1)}{0.01}$$

$$((( -1.99)^2 - 1) - (( -2)^2 - 1)) / 0.01$$

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

Input

$$\frac{((-1.99)^2 - 1) - ((-2)^2 - 1)}{0.01}$$

Result

-3.99

$$= \underline{\underline{-3.99}}$$

$$h = 0$$

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{f(x+0) - f(x)}{0} = \frac{f(x) - f(x)}{0} = \frac{0}{0}$$

↑  
MÄÄRITTELE -  
MÄTÖN

$x$  on tarkastelupiste ja  $h = 0.01$ .

©

$$f'(-1) = ?$$

$$\begin{cases} x = -1 \\ h = 0.01 \\ x + h = -0.99 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f'(-1) &\approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \frac{f(-0.99) - f(-1)}{0.01} \\ &= \frac{((-0.99)^2 - 1) - ((-1)^2 - 1)}{0.01} \\ &= \underline{\underline{-1.99}} \end{aligned}$$

$$f(x) = x^2 - 1$$

$$f'(1) \approx 0.01$$

$$(e) \quad f'(1) \approx 2.01$$

$$(f) \quad f'(2) \approx 4.01$$

5. Laske integraalit.

(a)  $\int_0^{\pi} \sin(x) dx$

Solution 2

(b)  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx$

Solution 0

(c)  $\int_0^{2\pi} \sin(x) dx$

Solution 0

① KERTAUS : LASKE KÄSIN



② TÄMÄIN VUOKON NUMERINEN LASKE  
VARSINAISEN ASIA

$$\textcircled{a} \int_0^{\pi} \sin(x) dx = \int_0^{\pi} -\cos(x) = -\underbrace{\cos(\pi)}_{=-1} - \left( -\underbrace{\cos(0)}_{=1} \right)$$

$$= -(-1) - (-1)$$

$$= 1 + 1 = \underline{\underline{2}}$$

$$\begin{cases} D \sin(x) = \cos(x) \\ D \cos(x) = -\sin(x) \end{cases}$$



② NUMERISESTI

$$\textcircled{a} \int_0^{\pi} \sin(x) dx = \underline{\underline{1.9998355...}}$$

↑ OCTAVE

OK

TARKKA ARVO  
on 2.

```
octave:1> format long
a=0;
b=pi;
N=100;
dx=(b-a)/N;
s=0;
for k=1:100
x=a+(b-a)*k/N;
s=s+sin(x)*dx;
end
s
s = 1.999835503887444
```

5. Laske integraalit.

(a)  $\int_0^\pi \sin(x) dx$

(b)  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx$

(c)  $\int_0^{2\pi} \sin(x) dx$

Solution 2

Solution ~~0~~ 2

Solution 0

$= 1,9998355 \dots$   
 $-2,49 \cdot 10^{-17}$   
 $= 0$

octave:18> format long

```
a=-pi/2;
b=pi/2;
N=100;
dx=(b-a)/N;
s=0;
for k=1:100
x=a+(b-a)*k/N;
s=s+cos(x)*dx;
end
s
s = 1.999835503887444
```

octave:28> format long

```
a=0;
b=2*pi;
N=100;
dx=(b-a)/N;
s=0;
for k=1:100
x=a+(b-a)*k/N;
s=s+sin(x)*dx;
end
s
s = -2.493034466764676e-17
```


$= -2,49 \cdot 10^{-17}$   
 $= 0$

# HARJOITELUUN OCTAVEN KÄYTTÖÄ

## ① INTEGROINTI A

format long

```
a=0;
b=2*pi;
N=100;
dx=(b-a)/N;
s=0;
for k=1:100
x=a+(b-a)*k/N;
s=s+sin(x)*dx;
end
s
```



## ② MUUTA MEILLE- TUTTU A

$$\begin{cases} ax + by = A \\ cx + dy = B \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \\ y \end{cases}$$

$2^{x+3} = 5^{3x} \rightarrow x = ?$

$$\begin{cases} 6x + 5y = 4 \\ x + 2y = 2 \end{cases} \parallel \cdot (-6)$$

MAT 1 - RATKAISU

$5x + 5y = 4$



$$\begin{cases} 6x + 5y = 4 \\ -6x - 12y = -12 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 0 \cdot x - 7y &= -8 \\ -7y &= -8 \quad || : (-7) \end{aligned}$$

$$y = \frac{8}{7}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{2}{7} \\ y = \frac{8}{7} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 6x + 5y &= 4 \\ 6x &= 4 - 5y \quad || : 6 \\ x &= \frac{2}{3} - \frac{5}{6}y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{2}{3} - \frac{5}{6} \cdot \frac{8}{7} \\ &= \frac{2}{3} - \frac{20}{21} \\ &= \frac{14}{21} - \frac{20}{21} = -\frac{6}{21} \\ &= -\frac{2}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 6x + 5y = 4 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

```
octave:69> A=[6,5; 1,2];
b=[4; 2];
x=A\b
x =
```

```
-2/7
8/7
```

$$\begin{cases} x = -\frac{2}{7} \\ y = \frac{8}{7} \end{cases}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{\text{Matriksi } A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\text{Tuntutan Vektori } \bar{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\bar{b}}$$

$$A \bar{x} = \bar{b} \quad || \quad A \setminus$$

$$A \setminus A \bar{x} = A \setminus \bar{b}$$

Háviäi

$$\bar{x} = A \setminus \bar{b}$$

OCTAVE LLA SIS

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

OCTAVELLA SIIS

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$
$$b = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$
$$x = A \setminus b = \dots$$



ESIM. LASKETAAN ARVIO INTEGRAALILLE

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx = 2$$

PUOLISUUNNIKAMENETELMÄLLÄ

NELJÄLLÄ OSAVÄLILLÄ

```
format long
a=0;
b=pi;
N=4;
dx=(b-a)/N;
s=0;
for k=1:N
x=a+(b-a)*k/N;
puoliSuunnikas=((sin(x)+sin(x-dx))/2)*dx
s=s+puoliSuunnikas
end
s
```



OCTAVEN TULOSTUS

```
puoliSuunnikas = 0.277680183634898
s = 0.277680183634898
puoliSuunnikas = 0.670379265333622
s = 0.948059448968520
puoliSuunnikas = 0.670379265333622
s = 1.618438714302142
puoliSuunnikas = 0.277680183634898
s = 1.896118897937040
s = 1.896118897937040
```

ARVIO = 1.89  $\longleftrightarrow$  2

ESIM. SAMAN LASKUN SIMPSONIN MENETELMÄLLÄ

```


octave:1> format long
a=0;
b=pi;
N=4;
dx=(b-a)/N;
PS=0; %puolisuunnikasmenetelmä
KP=0; %keskipistemenetelmä
for k=1:N
x=a+(b-a)*k/N;
PS=PS+((sin(x)+sin(x-dx))/2)*dx;
keskipiste=x-dx/2; %puolikas siirtymä takaisinpäin
KP=KP+sin(keskipiste)*dx;
end
Simpson=(PS+2*KP)/3
Simpson = 2.000269169948388

```


TOSI LÄHELLÄ

TARKKA ARVO

$0 \sim 2$



|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| <b>2 Polynomi</b>                                            | 8  |
| 2.1 Monomin ja potenssin derivointi                          | 8  |
| 2.2 Polynomin derivointi                                     | 8  |
| 2.3 Polynomin derivointi ja kuvaaja                          | 9  |
| 2.4 Sovellus: ääriarvokohta (paikallinen minimi tai maksimi) | 11 |
| 2.5 Potenssifunktion integrointi                             | 12 |
| <b>3 Eksponenttifunktio</b>                                  | 13 |
| 3.1 Eksponenttifunktion derivointi                           | 13 |
| 3.2 Yhdistetyn funktion derivointi                           | 14 |
| 3.3 Eksponenttifunktion derivointi ja kuvaaja                | 15 |
| 3.4 Sovellus: käänne piste                                   | 16 |
| 3.5 Eksponenttifunktion integrointi                          | 17 |
| <b>4 Logaritmifunktio</b>                                    | 18 |
| 4.1 Logaritmifunktion derivointi                             | 18 |
| 4.2 Logaritmifunktion derivointi ja kuvaaja                  | 19 |
| 4.3 Funktion potenssin integrointi                           | 20 |
| <b>5 Trigonometriset funktiot</b>                            | 21 |
| 5.1 Sinin ja kosinin derivaatta                              | 21 |
| 5.2 Tulon ja osamäärän derivaatta                            | 22 |
| 5.3 Sovellus: lämmi ja kondensaattori                        | 23 |
| 5.4 Funktion potenssin integrointi                           | 24 |
| 5.5 Sinin ja kosinin integrointi                             | 25 |
| <b>6 Numeerista derivoimia ja integroimia</b>                | 26 |
| 6.1 Numeerista derivoimia                                    | 26 |
| 6.2 Numeerista integroimia                                   | 27 |
| 6.3 Taylorin sarja                                           | 29 |



$$D x^7 = 7 x^6 \quad \int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$

$$D e^x = e^x \quad \int e^x dx = e^x$$
~~$$D 2^x = 2^x \ln(2) \quad \int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln(2)}$$~~

$$D e^{2x} = e^{2x} \cdot \frac{D(2x)}{dx} = 2e^{2x} \quad \int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2}$$

$$D e^{2x} = e^{2x} \underbrace{D(2x)}_{=2} \\ = 2e^{2x}$$

$$\int e^{2x} dx = \frac{e^{2x}}{2}$$

$$D \ln(x) = \frac{1}{x}$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x)$$

~~$$D \log_7(x) = D \frac{\ln(x)}{\ln(7)} \\ = \frac{1}{\ln(7) x}$$~~

$$\int \frac{1}{2x} dx = \int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} dx \\ = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx \\ = \frac{1}{2} \ln(x)$$

ESIM.

$$D x^7 = 7x^6$$

$$D 7^x = 7^x \ln(7)$$

$$D x^x = D e^{\ln(x^x)} \\ = D e^{x \ln(x)} \\ = \frac{e^{x \ln(x)}}{x^x}$$

$$= \frac{e^{x \ln(x)}}{x^x}$$

$$=$$

$$= \underline{\underline{x^x (\ln(x) + 1)}}$$

$$a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln(a)}$$

KANTAWUKSI

SAA 4INA e:n

$$D x \ln(x) \\ = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} \\ = \ln(x) + 1$$

$$D \sin(x) = \cos(x)$$

$$D \cos(x) = -\sin(x)$$

HARJOITELTU  $(fg)' = f'g + fg'$

HARJOITTELU  
nro 5

$$(fg)' = f'g + fg'$$

$$D \frac{f}{g} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$D f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x)$$

ESIM.  $D e^{\sin(x^3)} = e^{\sin(x^3)} \cdot D \sin(x^3)$   
 $= e^{\sin(x^3)} \cos(x^3) \cdot D x^3$   
 $= e^{\sin(x^3)} \cos(x^3) \cdot 3x^2 = 3x^2 e^{\sin(x^3)} \cos(x^3)$

$$\int \sin(3x) dx = \frac{-\cos(3x)}{3}$$

$$\int \cos(5x) dx = \frac{\sin(5x)}{5}$$

$$\int 3x^2 \sin(x^3) dx = \frac{-\cos(x^3)}{1}$$

$$D f(g(x)) = f'(g(x)) g'(x) \Rightarrow \int f'(g(x)) g'(x) dx = f(g(x))$$

or  $\rightarrow f'(x) = \cos(x)$

$$\int \cos(x) \cdot \sin(x)^7 dx = \frac{\sin(x)^8}{8}$$

$$\boxed{\int f'(x) f(x)^n dx = \frac{f(x)^{n+1}}{n+1}, n \neq -1}$$

$$\int \cos(x)^{1+2} \sin(x)^7 dx$$

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$$

$$\int \cos(x) \sin^7(x) dx$$

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$$

$$= \int \cos(x) (1 - \sin^2(x)) \sin^7(x) dx$$

$$= \int \cos(x) \sin^7(x) dx - \int \cos(x) \sin^9(x) dx$$

$$= \frac{\sin^8(x)}{8} - \frac{\sin^{10}(x)}{10}$$

$$2 \sin(a) \sin(b)$$

$$= \frac{\sin(a-b)}{\cos} - \frac{\sin(a+b)}{\cos}$$

$$\frac{1}{2} \int 2 \sin(7x) \sin(3x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \cos(4x) - \cos(10x) dx$$

$$= \frac{\sin(4x)}{2 \cdot 4} - \frac{\sin(10x)}{2 \cdot 10}$$

$$-\int \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} dx = -\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = -\ln(f(x)) = -\ln(\cos(x))$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x)$$

$$D \ln(f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln(f(x))$$